

Contributions à l'étude de la Faune

DES

Microlépidoptères du Valais

par M. le révérend chanoine E. Favre

(Suite).



V. GLYPHIPTERYGIDÆ.

A. Choreutinæ.

Gen. *Choreutis* Hb. 1818.

Bjerkandrella Thb. Diss. Ent. I p. 36. *Vibrana* Hb.

Ch. en mai et juin entre les feuilles de *Inula salicina*, *Carduus crispus* et *Carlina acaulis*. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre (P.).

Myllerana F. E. S. 3. 2. 377, 147. *Angustana* Hb.

Ch. en juillet et août dans les feuilles du *Scutellaria*. Pap. en août et septembre. Rare. Région sous-alpine. Haut-Valais (A.) ; sur le Simplon.

Gen. *Simæthis* Leach. 1815.

Nemorana Hb. Tor. 3. *Incisalis* Tr.

Ch. en août et septembre dans les feuilles roulées du *Ficus*. Pap. d'avril en juin. Rare. En Valais (A.)

Pariana Cl. Ic. 10, 9. *Parialis* Tr., *Lutosa* Hw.

Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur *Pyrus com.* et *Malus*, *Crataegus*, *Rosa*, *Cydonia*, etc. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Assez rare. Dans la région inférieure. La Croix.

Diana Hb. Tort. 274. *Decorana* Z., *Luridana* Wk.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet autour des sapins et des genévriers. Rare. Haut-Valais (A.); Salquen en avril et mai (de R.)

Fabriciana L. S. N. XII, 880. *Oxyacanthella* L. l. c. 886.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur *Urtica dioica*, *Parietaria*, etc. Pap. en mai et juin, puis en automne. Assez commun de la plaine aux alpes jusqu'à 1600 m. Zermatt, Mont-Chemin, La Croix; au bas des Gorges du Trift à Zermatt, un essaim volant autour d'une touffe d'orties en 1899 (de R.).

B. Glyphipteryginæ.

Gen. **Glyphipteryx** Hb. 1818.

Fuscoviridella Hw. Lep. Br. 569. *Albicostella* Dup.

Ch. inconnue. — Pap. en mai et juin. Rare. Dans les environs de Martigny.

Thrasonella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 658. *Seppella* Hb.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Drosera*, *Juncus*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Haworthana Steph. Ill. IV, 262. *Zonella* Z.

Ch. d'août en avril suivant sur *Eriophorum* (dans les capitules) et sur *Asplenium Trichomanes*. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Environs de Martigny.

Equitella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 659.

Ch. d'août en mai suivant sur *Sedum album*, *acre* et *sexangulare* (au printemps dans les pousses malades) et sur *Silene*. Pap. de juin en août. Rare. Val de Tourtemagne, Riffelberg près Zermatt (Frey); La Forclaz, Salquenen.

Majorella Hein-Weck 397. *Equitella* var. HS.

Ch. comme la précédente. Pap. en juillet et août. Rare. Au Riffelberg près Zermatt (Frey), Salquenen (de R.).

Fischeriella Z. Is. 1839, 204. *Desiderella* F.

Ch. de juillet en avril suivant sur *Dactylis glomerata*; mangeant les graines. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (A.), Sierre.

C. Douglassiinae.

Gen. Tinagma Z. 1839.

Perdicellum Z. Is. 1839, 204.

Ch. en septembre sur *Fragaria vesca*, *Potentilla cinerea*. Pap. de mai en juillet. Rare. Viège (B.); environs de La Croix.

Dryadis Stgr. z. b. V. 1872, p. 735. *Dryadella* Frey.

Ch. sur *Dryas octopetala*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la haute région alpine jusqu'à 2100 m. Pierre à Voir, glacier de Trient.

Gen. Douglasia Stt. 1854.

Balteolella F. R. p. 247. *Borkhauseniella* HS.

Ch. en septembre sur *Echium vulgare*. Pap. d'avril en juin. Rare. Haut-Valais (A.); Salquenen, Viège.

Ocnerostomella Stt. Tr. E. S. Lond. I, p. 6. *Echii* HS.

Ch. inconnue, Pap. de mai en juillet, volant sur *Echium* et *Thymus*. Rare. Haut-Valais. (A.)

VI. YPONOMEUTIDÆ.

A. Yponomeutinæ.

Gen. *Scythropia* Hb. 1818.

Cratægella L. S. N. XII, 885.

Ch. en mai et juin en société dans de grands nids sur *Cratægus*, *Prunus spinosa*, etc. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier.

Gen. *Herrichia* Stgr. 1870.

Excelsella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 292. *Hirticruralis* Peyer.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. Dans la région inférieure. Environs de Martigny.

Gen. *Yponomeuta* Latr. 1796. (*Hyponomeuta* Z.)

Egrediellus Dup. XI, 299, 9 p. 345.

Ch. en mars et avril sur *Erica arborea* et *scoparia*. Pap. en mai et juin. Assez rare. Haut-Valais (A.).

Stannellus Thb. Diss. Ent. VII, 108. *Rufimitrellus* Z.

Ch. au pied des touffes de *Sedum maximum*, vivant soit sur les feuilles basses, soit sur les racines. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Dans la région inférieure. St-Maurice, Fully, Bâtiaz, Martigny, La Croix, Plan-Cerisier, Salquenen.

Vigintipunctatus Retz. Gen. et Sp. p 52. *Sedella* Tr.

Ch. de l'automne en juin, en société sur *Sedum album*, *maximum* et *Telephium*. Pap. de mai en août. Rare. Haut-Valais (A.), Salquenen.

Plumbellus Schiff. S. V. 139. Roscidella HB.

Ch. d'avril en juin sur *Evonymus europæus* et *Frangula Alnus*, d'abord sur les jeunes pousses et plus tard sur les feuilles. Pap. de juin en août. Commun dans la région chaude inférieure. Martigny, Fully, Sion, Sierre, Viège, Salquenen.

Padellus L. S. N. X, 535. Variabilis Z.

Ch. sur l'aubépine, le prunier et le prunellier. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles jusqu'à 1800 m. Environs de Sion et de Sierre (Paul), pas rare à Salquenen (de R.).

Rorellus Hb. 234. Helicella Frr.

Ch. en juin et juillet sur *Salix alba*, *capræa* et *Helix* en société dans de grands nids. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Sion.

Malinellus Z. Is. 1844, 220.

Ch. en mai et juin en société dans de grands nids. sur *Pyrus Malus*. Pap. en juillet. Très commun et très nuisible. Partout dans la région des arbres fruitiers. Martigny, Fully, Sion, Sierre, etc.

Mahalebellus Gn. Ind. 105.

Ch. en mai et juin en société dans de grands nids sur *Prunus Mahaleb*. Pap. en juillet et août. Pas rare, mais un peu localisé. Dans les endroits chauds. Coteau de Ravoire près Martigny.

Cognatellus Hb. 391-2 (false Cagnagella). Evonymi Z.

Ch. en mai et juin, en société dans de grands nids sur *Evonymus europæus*. Pap. en juillet. Très commun, dans la région chaude des arbres à feuilles. Martigny, Fully, Sion, Sierre, etc. Salquenen.

Evonymellus L. S. N. X, 534. Padi Z.

Ch. en mai et juin, en société dans de grands nids sur *Prunus Padus*. Pap. en juillet. Pas rare. Dans la

région des arbres à feuilles et jusqu'à plus de 1000 m. dans les sous-alpes. Martigny-Combe, Bovernier, Sembrancher, Sion, Sierre, etc.

Gen. Swammerdamia Hb. 1818.

Caflischiella Frey, Lep. der Schw. p. 344.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Environs de Gamsen dans le Haut-Valais (A.); Paul l'indique aussi en Valais, probablement à Sion ou à Sierre.

Gen. Hofmannia Hein-Wck. 1877.

Fasciapennella Stt. Cat. 22.

Ch. inconnue. Pap. en avril. Très rare. En Valais (Frey).

Saxifragæ Stt. Tr. E. S. Lond. 1868, 139. *Fasciapennella* Frey; *Alpicella* HS.

Ch. d'avril en juin sur *Saxifraga aizoon*, mangeant l'intérieur de la plante. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et alpes. Zermatt (Frey); Plan-Cerisier.

Gen. Argyresthia Hb. 1818.

Conjugella Z. Js. 1839, 204. ab. *Maculosa* Tgstr.

Ch. dans les fruits de *Sorbus aucuparia* et de *Fraxinus excelsior*. Pap. en juin et juillet, puis en septembre. Rare. En Valais (A.); Zermatt (Fr.).

Mendica Hw. Lep. Br. 517. *Cæsiella* Tr. *Tetrapodella* Z.

Ch. en avril et mai dans les jeunes pousses de *Prunus spinosa*. Pap. en juin et juillet. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen.

Reticulata Stgr. Stett. e. Z. 1877, p. 205.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Valais (Rebel); La Forclaz, hôtel de la Pierre à Voir.

Spiniella Z. Is. 1839, 204.

Ch. en automne et jusqu'en mai sur *Sorbus aucuparia*, *Prunus spinosa*, etc. Pap. de mai en août. Rare dans la région des arbres à feuilles. Martigny, Plan-Cerisier.

Albistria Hw. Lep. Bro. 517. Semitestacella Wd., Fagetella Z.

Ch. de mai en juin sur le hêtre, le prunellier, dans les jeunes pousses. Pap. en juillet et août. Assez rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Ephippella F. Gen. I, 297. Pruniella HC.; Tetrapodella Steph.

Ch. d'avril en juin sur noisetier, cerisier, pommier, sorbier, etc., dans les jeunes pousses. Pap. de mai en août. Pas rare et vole en très grande abondance là où il se trouve. Haut-Valais (A.); environs de Martigny, Salquenen.

Nitidella F. Mant. II, 241. Pruniella Tr., Purpurascens Stt.

Ch. d'avril en juin dans les jeunes pousses de *Crataegus*, *Prunus domestica* et *spinosa*, *Pyrus communis*, *Berberis* et *Hippophaë*. Pap. de mai en août. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Martigny, Fully, etc.

Retinella Z. Is. 1839, 205.

Ch. en avril et mai sur *Quercus*, *Betula alba*, *Salix caprea*, dans les pousses. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.); Martigny, Fully.

Cornella F. S. E. 657, 8. Curvella Steph.

Ch. en avril et mai sur *Cornus*, *Crataegus*, dans les pousses des feuilles. Pap. en juin et juillet. Région chaude inférieure. Rare. Haut-Valais (A.); Plan-Cerisier.

Sorbiella Tr. IX, 2, 160.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août, dans les pousses et les feuilles de *Sorbus Aria*, et *aucuparia*, *Cotoneaster*, *Mespilus*. Pap. en juin et juillet. Rare. Environs de Zermatt (Frey).

Pygmæella Hb. 353. Semifasciella Steph.

Ch. en avril, mai et juin dans les pousses de *Salix capræa* et *purpurea*. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Martigny.

Gædartella L. S. N. X, 541. Aurivitella Wd.

Ch. de mars en mai dans les chatons de *Betula*, *Alnus*. plus tard sous l'écorce. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre.

Huguenini Frey, Mitth. VI, p. 369. (1882).

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Andereggiella Dup. XI, 305, 9.

Ch. en avril et mai dans les pousses de *Corylus avellana*, *Pyrus Malus*, etc. Pap. de juin en août. Rare. Région inférieure. Brigue (A.); Martigny.

Trifasciata Stgr. Cat. ed. II p. 425, ubi descriptio.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Environs de Gamsen ou sur le Simplon (A.).

Marmorata Frey, Lep. der Schw. p. 384.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Gen. Cedestis Z. 1839.

Gysselinella Dup. XI, 305, 4 p. 461. Gysseleniella Z.

Ch. en avril et mai sur *Pinus Abies*, *sylvestris* et *mughus*, dans les pousses enveloppées d'un nid de soie. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, Salquenen.

Farinatella Dup. XI, p. 473. *Farinella* Dup.

Ch. en avril et mai, elle mine dans les feuilles aciculaires du pin. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, Mt-Ravoire.

VII. PLUTELLIDÆ.

A. Plutellinæ.

Gen. *Plutella* Schrk. 1802.

Geniatella Z. Is. 1839, 188.

Ch. peut-être sur *Cerastium* ou *Hutchinsia*. Pap. de mai en juillet. Rare et s'élevant jusqu'à 2300. m. Dans la haute région alpine. Sur le Simplon (A.); Riffelberg près Zermatt (F.); Gornergrat, La Forclaz, hôtel de la Pierre à Voir.

Maculipennis Curt. Guide 186 (1831). *Xylostella* Hb., *Cruciferarum* Z.

Ch. polyphage sur arbustes et plantes basses, surtout sur les Crucifères. Pap. pendant toute la belle saison. Commun partout, de la plaine aux alpes jusqu'à 2500 m. La Croix, château de La Bâtiaz, Plan-Cerisier, Arpille, etc. Zermatt où il est très commun (de R.).

Annulatella Curt. B. E. 420. *Horticola* Tgstr.

Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur *Cheiranthus*. Pap. en avril et mai, puis de juillet à septembre. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. La Croix, environs du château de la Bâtiaz.

Senilella Zett. Ins Lap. 1001. *Marmorosella* Wk., *Dalella* Stt., *Septentrionum*. Stgr.

Ch. en juin et juillet sur les feuilles de l'*Arabis petræa* et autres Crucifères. Pap. en août et septembre. Rare. Région sous-alpine jusqu'à 1500 m. Mt-Chemin, La Forclaz.

Gen. Cerostoma Latr. 1802.

Vitella L. S. N. X, pag. 264. *Sisymbrella* Tr.

Ch. en mai et juin sur *Fagus*, *Ulmus*, *Quercus*, etc., entre des feuilles filées ensemble. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région forestière inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

a) **ab. Carbonella** Hb. 421, Ailes antér. unicolores, noirâtres. Avec le type.

Instabilella Mn. z. b. V, 1866, 351, t. 1, f. 5-7.

Ch. d'août en mai suivant sur les feuilles de *Chenopodium*, *Plantago*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région chaude des arbres à feuilles. Au-dessus de Plan-Cerisier.

Radiatella Don. Nat. Hist. III, t. 77. *Variella*, *Fissella* et *Lutarella* Hb.

Ch. de mai en juillet sur le chêne. Pap. très variable, de fin juillet au printemps suivant. Assez commun dans les coteaux chauds et secs de la région du chêne. Follatères près Branson, au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Salquenen.

Sylvella L. S. N. XII, 893.

Ch. en mai et juin sur le chêne. Pap. de juillet en septembre. Répandu mais rare. Dans la région inférieure. Follatères près Branson, Salquenen en octobre 1904. (2^e génération ?) de R.

Lucella F. S. E. 667, 4. *Antenella* et *Mucronella* Hb.

Ch. en juin sur le chêne. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, Follatères près Branson, Salquenen.

Alpella Schiff. S. V. 135. *Alpinus* F.

Ch. en juin sur le chêne. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, Follatères près Branson, Salquenen.

Persicella F. Mant. II, 255, 16. Sulphurella Hb.

Ch. en avril et mai sur le pêcher et l'amandier. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région des vignes sur le tronc de l'arbre nourricier, quelquefois fort nuisible. Martigny et les environs, Sion, Saillon, Salquenen, Sierre.

Asperella L. F. S. N^{ro} 1147.

Ch. en mai et juin sur *Cratægus*, *Prunus domestica*, *Pyrus Malus* et *communis*, *Quercus*. Pap. dès fin juin jusqu'en avril suivant. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. La Croix, Pont de Rossetan, Branson, Salquenen.

Horridella Tr. X, 3. 191. Falcella Steph.

Ch. de juin en août sur le prunellier, le poirier et le pommier. Pap. de mai en juillet. Rare. Région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.) ; Martigny, Salquenen.

Nemorella L. S. N. X, 536. Hamella Hb.

Ch. en mai et juin sur le chèvrefeuille. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région inférieure. A Salquenen (de R.).

Xylostella L. S. N. XII, N^{ro} 389. Harpella Schiff., Dentela F.

Ch. en mai et juin sur les divers chèvrefeuilles et sur *Erucastrum*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles et dans les sous-alpes jusqu'à 1700 m. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, au-dessus de Plan-Cerisier, Zermatt, Salquenen.

Gen. Theristis Hb. 1818.

Mucronella Sc. Ent. Car. N^{ro} 643. Caudella L., Cul-trella Hb.

Ch. en juin et juillet sur *Evonymus europæus*, sur les feuilles, puis en septembre sur les fruits, toujours en

société. Pap. en avril, puis en août et septembre (passe l'hiver pour reparaître au premier printemps). Rare. Dans la région chaude inférieure. Aux Follatères près Branson en mars.

B, Orthotæliinæ.

Gen. *Orthotælia* (r. *telia*) Steph. 1834.

Sparganella Thb. Diss. Ent. VII, 95, *Sparganiella* Tr., *Venosa* Steph.

Ch. en mai et juin sur *Iris germanica* et *pseudacorus*, *Sparganium simplex* et *ramosum*, etc. sur les tiges et sur les feuilles. Pap. en juillet et août. Pas rare, dans les lieux marécageux de la plaine. Sion, Sierre.

VIII. GELECHIIDÆ.

A Gelechiinæ.

Gen. *Metzneria* Z. 1839. (*Parasia* Dup.).

Paucipunctella Z. Is. 1839, 202.

Ch. sur les fleurs de Camomille. Pap. de juin en août. Très rare. Région chaude. Deux ex. de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

Lapella L. S. N. X, 537. *Silacella* Wd., *Aestivella* HS.

Ch. de l'automne jusqu'en mai dans les capitules de *Lappa*. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Sion, Vex.

Aprilella HS. 963, V, pag. 207.

Ch. inconnue. Pap. en avril et mai. Très rare. Environs de Gamsen (A.); Sion, Sierre (P.); Salquenen (de R.).

Neuropterella Z. ls. 1839, 202.

Ch. de l'automne en mai sur *Carduus*, *Carlina*, *Cirsium acaule* et *Centaurea*, dans les capitules. Pap. en juillet et août. Très rare. Plaine et sous alpes jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A.); sur le Simplon.

Gen. Chelaria Hw. 1829.

Hübnerella Don. Nat. Hist. XI, t. 382, 2. Conscriptella Hb.

Ch. en mai et juin sur *Betula*, *Corylus*, *Populus tremula*, dans des nids de soie. Pap. de juillet à octobre. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

Gen. Bryotropha Hein. 1870.

Terrella Hb. 170. **Inulella** Hb., **Zepyrella** Tr.

Ch. en mai et juin dans les touffes de graminées et dans la mousse. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Zermatt, Anniviers, Salquenen (de R.).

Decrepidella HS. 508, 533, V, p. 177. **Decrepitella** Hein.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Très rare. Haut-Valais (A.).

Basaltinella Z. ls. 1839, 198.

Ch. en avril et mai sur *Tortula muralis*, dans les rochers de basalte. Pap. de juin en août. Rare. Haut-Valais (A.).

Gen. Gelechia (Hb. 1818) Z.

Pinguinella Tr. IX, 1, 224. **Populella** Hb. Turpella HS.

Ch. d'avril en juin sur nos divers peupliers entre les feuilles roulées et dans les fentes de l'écorce. Pap. de juin en août. Commun dans la région inférieure. Entre Fully-Branson et Martigny, Salquenen.

Rhombella Schiff. S. V. 139.

Ch. dans les feuilles roulées des arbres fruitiers et dans leurs fruits, d'avril en juin. Pap. en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Salquenen (de R.).

Hippophaëlla Schrk. Fn. B. II, 115. Basipunctella HS.

Ch. de juin en août sur *Hippophaë rhamnoides*. Pap. d'août en octobre. Assez rare. Dans la plaine. Environs de Gamsen (A.); Sion, Sierre.

Basigultella Hein. 109. ? Albicans Hein 199.

Ch. de l'automne au printemps sur le chêne. Pap. en juin. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, Martigny, Salquenen.

Tragicella von Heyd. Stt. e Z. 1865, 380. Libidinosa Staud.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Région moyenne forestière. Un seul ex. au-dessus de Salquenen. (de R.).

Distinctella Z. Is. 1839, 199. Fumatella Dgl., Celerella Stt.

Ch. en mai et juin dans les feuilles roulées de *Genista tinctoria* et dans des galeries de soie dans la mousse, sous les pierres dans des lieux secs. Pap. de juin en août. Pas rare. Haut-Valais (A.); Evolène (M. gen.); Sion, Sierre, Salquenen.

Ochripalpella Frey, Lep. der Schw. p. 358.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.).

Flavicomella Z. Is. 1839, 198.

Ch. en automne et au printemps sur *Prunus spinosa*. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (A.); Martigny, Fully.

Velocella Dup. XI, 297, 3. Subsequella Tr. Aterrimella Rbl.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur *Rumex acetosella* dans un fourreau à la surface du sol. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny, Grimentz.

Peliella Tr. X, 3. 198.

Ch. d'avril en juin sur *Rumex acetosella* sur les feuilles à la surface du sol dans un tissu léger. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Ericetella Hb. 470. Betulea Hw., Gallinella Tr.

Ch. en automne et au printemps sur *Erica vulgaris*, etc. dans un tissu de soie entre les branches. Pap. de mai en juillet. Un peu partout mais toujours rare. Région inférieure chaude. Haut-Valais (A.); Mt-Ravoire.

Infernalis HS. 584. Infernella HS., Violacea Tgstr.

Ch. de septembre au printemps sur *Vaccinium myrtillus* et *Sedum palustre*. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 2000 m. Près de Zermatt (Frey).

Rumicivorella Mill. An. S. Cannes 1880 p. 11, t. 10, f. 13.

Envergure 18-19^{mm}. Ailes supérieures étroites, allongées, presque parallèles, arrondies à l'apex, avec la côte légèrement falquée, d'un noir profond, mais dont le bord interne est éclairé par une large bande ondulée d'un blanc jaunâtre formant deux dents vers le milieu de l'aile, lesquelles se détachent sur le fond noir. Deux taches d'un blanc jaunâtre appuyées à la côte sont assez apparentes. La frange est large, blanchâtre et lavée de noir à l'apex. Les ailes inférieures, plus larges que les supérieures, sont luisantes et d'un gris noirâtre avec la frange lavée de roussâtre. Les supérieures en dessous sont luisantes, d'un gris noir foncé, sauf la frange qui est d'un brun roussâtre. Sur la côte, près de l'apex, il existe deux

ou trois stries blanches. Les palpes sont jaunâtres, avec le dernier article annelé de noir. La tête et le thorax sont d'un blanc jaunâtre. Les côtés du thorax sont noirs. L'abdomen est gris et l'extrémité jaunâtre. Les pattes sont noires et légèrement tachées de jaunâtre ; les inférieures sont munies d'une paire de larges tarses.

Ch. en juillet sur *Rumex acetosa*. Pap. en août. Rare. Dans la région chaude inférieure. La Croix, près Martigny.

Mulinella Z. Is. 1839, 199. Interruptella Steph.

Ch. d'avril en juin sur *Spartium scoparium*, *Genista germanica*, etc., dans les fleurs. Pap. en juillet et août. Rare. Région forestière inférieure. Haut-Valais (A).

Galbanella Z. Is. 1839, 200. Angustella Hein.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Contre les troncs dans les bois de pins et aussi par terre sur la mousse. Coteau de Ravoire, Mt-Chemin.

Boreella Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 105.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les endroits marécageux. Haut-Valais (A.).

Continuella Z. Is. 1839, 198. Trimaculella Pack.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les alpes élevées, contre les rochers. A la Furka (Frey) ; hauts pâturages de la vallée de Tourtemagne (de R.).

a) var. **Nebulosella** Hein. 218. Plus grand, avec les ailes antér. plus marquées de blanc. Avec le type.

Perpetuella HS. 511, V. p. 180.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine. Haut-Valais (A.), hauts pâturages de Sion et de la vallée de Tourtemagne.

Interalbicella HS V. p. 187.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les Alpes. Haut-Valais (And.).

Virgella Thb. Diss. Ent. VII, 92. Longicornis Curt. Histrionella Hb.

Ch. en avril et mai sur *Erica vulgaris*, *Vaccinium vitis-idaea*. Pap. de mai en juillet. Pas rare et montant très haut dans la région alpine, mais aussi dans la région moyenne. Arpilles, La Forclaz, glacier de Trient, Bovine, col de Tracuit (3100 m.). Zermatt, Simplon.

Elatella HS. 499, V. p. 168.

Ch. inconnue. Pap. en juillet, il vole sur *Chrysanthemum*. Rare. Région alpine. La Furca (Boll.).

Dzieduszykii Now. M. S. N. p. 20. Melaleucella Const. Mariæ Fr.

Ch. inconnue ; Chrys. sous les pierres. Pap. en juillet et août. Rare et ne volant que sur les plus hauts cols débarrassés de neige, de 2600 à 3000 m. Riffelberg et Gornergrat, près Zermatt (Fr.) ; col de Torrent, sur l'Augstbordpass, etc.

Diffinis Hw. Lep. Br. 551. Dissimilella Tr. Scabi-della Z.

Ch. en juillet, puis de septembre en avril suivant sur *Rumex acetosa* dans des nids de soie. Pap. en mai, puis en août et septembre. Rare. Au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

Electella Z. Is. 1839, 198.

Ch. sur *Pinus abies* et *picea* et sur le genévrier. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la région forestière. Salquenen (de R.).

Scalella Sc. Ent. Car. N^{ro} 654. Alternella Hb. Bicolorella Tr.

Ch. en juillet et août, puis d'octobre en avril suivant dans la mousse. Pap. en mai et juin, puis en septembre. Rare. Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny.

Viduella F. E. S. III, 2, 299, 53. Leucomella Qu. Luctuella Dup.

Ch. commune dans la mousse et les lichens de conifères. Pap. en juin et juillet. Assez rare et se trouve surtout dans la région moyenne; il vole autour de *Vaccinium* et *Betula*. Haut-Valais (A.); Zermatt, Grimentz, Mt-Chemin.

Tessella Hb. Vög. 3 (1793.). Quadrella F. Scopolella Hb.

Ch. en mai et juin sur *Berberis* dans des feuilles liées ensemble. Pap. de juin en août. Assez rare. Région sous-alpine. Zermatt (Fr.); Salquenen, Grimentz (de R.)

Maculatella Hb. 162 (Subsequella).

Ch. en mai et juin sur *Coronilla varia*, dans des feuilles liées en forme de siliques. Pap. de juin en août. Assez rare. Valais (A.); coteau de Ravoire.

(Lita Tr.)

Valesiella Staud. Stt. e. Z. 1877, p. 205.

Ch. inconnue Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (And.).

Steudeliella Frey, Lep. d. Schw. p. 363.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Région alpine. Haut-Valais (A.).

Psilella HS. 496, V, p. 171.

Ch. en avril et mai sur *Artemisia campestris*, *Gnaphalium arenarium*, sur les feuilles. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Artemisiella Tr. IX, 2, 97.

Ch. en mai et juin sur *Artemisia campestris*, *Thymus Serpyllum*, en nids au sommet des feuilles. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier.

Atriplicella F. R. 78 p. 223.

Ch. en mai et juin sur *Atriplex*, *Chenopodium hybridum*, *Cirsium lanceolatum*, mangeant les graines et se tenant dans des tubes de soie. Pap. de juillet en septembre. Rare. Région inférieure. Plan-Cerisier, Salquenen.

Samadensis Pfaffenz. Stett. e. Z. 1870, 321. Instabilella Hein.

Ch. en mai et juin sur *Plantago* et *Atriplex*. Pap. en juillet et août. Rare. Région sous-alpine jusqu'à 1800 m. Mt-Chemin, La Forclaz, glacier de Trient, au-dessus de Salquenen.

Tussilaginella Hein 251. Tussilaginis Frey.

Ch. en août et septembre sur *Petasites albus*, et *Tussilago Farfara* dans l'intérieur des feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Martigny, Fully.

Insulella Hein 251. Insularis Stgr.

Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (A.).

Difflluella Hein 247 ; Frey Mitth. III, p. 252. (1870).

Ch. inconnue. Pap. en août. Rare. Dans la région élevée des alpes. Riffelberg près Zermatt (F.).

Cacuminum Frey Mitth. III (1870) p. 252. Culminicola Stgr.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine élevée. Riffelberg près Zermatt (F.).

Excelsa Frey Lep. der Schw. p. 363.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la haute région alpine jusqu'à 2500 m. Gornergrat au-dessus de Zermatt (F.).

Chrysanthemella Hofm. Stett. e. Z. 1867. 202.

Ch. en septembre et octobre dans les feuilles basales de *Chrysanthemum Leucanthemum*. Pap. en avril et mai. Pas commun. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny.

Moritzella Hb. 476-7.

Ch. en juin et juillet sur *Lychnis dioica*, en société sur les fleurs et dans les graines. Pap. de juillet en septembre. Environs de Gamsen (A.); Sion, Sierre, environs de Martigny.

Kiningerella HS. 471, V p. 186.

Ch. inconnue. Pap. en août. Rare. Sur les troncs de peupliers en plaine. Martigny, Fully.

Leucomelanella Z. Is. 1839, 198. ? *Affiniella* Zett.

Ch. en mai sur *Silene nutans*, en nids dans les feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région chaude inférieure, contre les murs, etc. Martigny, Fully, Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Salquenen.

Tischeriella Z. Is. 1839, 199.

Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Coteau de Ravoire, Branson.

(Teleia Hein.).

Vulgella Hb. 346. *Aspera* Hw.

Ch. de août en mai suivant sur *Crataegus oxyacantha*, *Prunus domestica*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier.

Scriptella Hb. 152. *Tremella* Wd.

Ch. d'août en octobre sur *Acer campestre*, et *platanoides* dans des feuilles enroulées par des fils de soie. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.); environs de Martigny (W.); Salquenen (de R.).

Alburnella Dup. IX, 298, 2.

Ch. en avril et mai sur *Betula alba* dans des feuilles recourbées au bout par des fils de soie. Pap. en juin et juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Sequax Hw. Lep. Br. 552. *Apicistrigella* HS.

Ch. en mai et juin sur *Helianthemum vulgare*, etc.
Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à
1600 m. Au-dessus de Plan-Cerisier ; Salquenen.

Fugitivella Z. Is. 1839. 200.

Ch. sur l'orme. Pap. en mars et avril. Très rare.
Dans la région chaude inférieure. Deux ex. de Salquenen en 1905. (de R.).

Humeralis Z. Is. 1839, 200. *Lyellella* West.

Ch. en mai et juin sur *Quercus* et *Cornus sanguinea*. Pap. de juin au printemps suivant. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoire.

Erschoffii Frey Lep. d. Schw. 361.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.).

Killiasii Frey Lep. d. Schw. 362.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.).

Proximella Hb. 228. ? *Mouffetella* L.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Betula* et *Alnus* à la manière des Tortricides. Pap. de mai en juillet. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; environs de Sion (P.).

Saltuum Z. Stt. e. Z. 1878, 140.

Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Riddes et Ecône.

Notatella Hb. 334. *Euratella* HS.

Ch. en août et septembre sur *Salix capræa* et *purpurea* entre deux feuilles. Pap. d'avril en juin. Rare. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny.

Vagæ Now. En. 189, M. S. N. 15 f. 5.

Ch. en mai et juin sur le chêne, etc. Pap. de juillet au printemps suivant. Rare. Dans la région inférieure. En Valais (Rebel).

Triparella Z. Is. 1839, 200. *Dodecella* Wd.

Ch. en juin, puis en août et septembre sur le chêne dans une galerie serpentant entre deux feuilles liées ensemble. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. Pas commun. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Branson (F.); Salquenen (de R.).

Luculella Hb. 397. *Subrosea* et *Luctuella* Wd.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Betula* et *Quercus*, creusant des galeries formées d'excréments dans la mousse et les lichens de ces arbres. Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire.

Gen. *Acompsia* Hb. 1818 **(*Brachycrossata* Hein).**

Cinerella Cl. Ic. 11, 6. *Ardeliella* Hb. *Spodiella* Tr.

Ch. inconnue. Pap. de mai en août. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Tripunctella Schiff. S. V. 319. *Antirrhinella* Mill.

Ch. sous les pierres. Pap. en juillet et août. Un peu partout dans nos hautes alpes, mais nulle part commun, entre 1600 et 2600 m. Haut-Valais (A.); La Forclaz, Simplon, Zermatt.

a) var. *Maculosella* HS. 463, V. p. 202. Ailes antér. avec des taches foncées opposées. Avec le type. Grimsel (Boll.).

Gen. Tachyptilia Hein 1870.

Populella Cl. Ic. 11, 5. **Blattariella** Hb. **Tremulella** Dup.

Ch. en mai et juin sur les divers peupliers, le bouleau, le saule marceau dans des feuilles roulées. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W. et F.); Salquenen en 1904 (de R.).

Gen. Xystophora Hein 1877.
(Doryphora Hein).

Servella Z. Is. 1839, 201. **Ferrea** Frey.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Région alpine. Riffelberg (Fr.); Anniviers.

Morosa Mühl. Stt. e. Z. 1864, 101.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Lysimachia vulgaris*, *Lytrum salicaria* dans les jeunes pousses. Pap. en juillet et août. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.).

Tenebrella Hb. 434. ♀ **Tenebrosella** Z. **Bufonella** Mill.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Rumex acetosa* sur les racines et à la base des pousses. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier.

Atrella Hw. 567. **Umbriferella** HS. **Aurimaculella** Höfn.

Ch. de septembre en mai suivant dans les tiges d'*Hypericum*. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Ganther près Bérisal.

Unicolorella HS. V. p. 196. **Immaculatella** Dgl.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.).

Gen. Anacamptis (Curt. 1827) Hein.
(Aproærema Durr. 1897).

Coronillella Tr. IX, 2, 87.

Ch. en avril et mai sur *Coronilla varia*, *Vicia*, *Astragalus*, entre des feuilles liées. Pap. de juin en août. Répandu dans la région inférieure et les sous-alpes jusqu'à plus de 2000 m. Haut-Valais (A.); au-dessus de Plan-Cerisier, Grimentz.

Biguttella HS. 521, V. pag. 192.

Ch. en mai et juin, puis en septembre et octobre sur *Medicago sativa*, *Genista tinctoria*, dans les pousses. Pap. en mai, puis en juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W.); Salquenen (de R.).

Remissella Z. Is. 1847, 854. **Vetustella** HS.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Submisella Frey Lep. d. Schw. p. 367.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. Environs de Gamsen (A.).

Anthyllidella Hb. 330. **Psoralella** Mill.

Ch. sur les feuilles des légumineuses: *Anthyllis vulneraria*, *Lathyrus pratensis*, *Onobrychis*, etc. Pap. de juin en août. Répandu un peu partout et atteignant les 2000 m. dans les alpes. Salquenen, Gruben, Grimentz, etc. (de R.).

a) var. Caliginosella Dup. Suppl. t. 4, p. 291. pl. 74.

Avec le type. mais rare. Un ex. à Salquenen (de R.).

Vorticella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 651. **Ligulella** Z.

Ch. en mai et juin, puis en septembre sur *Lotus corniculatus*, *Genista tinctoria*, entre des feuilles liées ensemble. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W. et F.); Salquenen (de R.).

Tæniolella Z. Is. 1839, 201.

Ch. sur *Lotus corniculatus*, *Medicago minima* et *Trifolium*. Pap. en juillet. Pas très rare. Dans les régions inférieure et moyenne. Valais (de R.).

Gen. Epitheatia Meyr. 1896. (Brachmia Hein.).

Pruinosella Z. Is. 1846, 288.

Ch. en mai et juin sur *Vaccinium uliginosum*, dans les dernières feuilles liées ensemble. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les sous-alpes. Haut-Valais (A.); sur le Simplon.

Nigricostella Dup. IV, 74, 9. p. 228.

Ch. en juin, puis en août et septembre sur *Medicago sativa* dans les dernières feuilles liées ensemble. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Salquenen (de R.).

Amœnella Frey Mitth. VI, 1882 p. 366.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Gen. Aristotelia Hb. 1818. (Ergatis Hein.).

Decurtella Hb. 311. Turbatella Tr.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans les pâturages secs des vallées montagneuses. Environs de Martigny (W.).

**Gen. Recurvaria (Hw. 1829) HS.
(Aphanaula Meyr. 1895.)**

Leucatella Cl. Ic. 2, 3. Albocinctella Dup.

Ch. en mai et juin sur *Crataegus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Pyrus Malus*, *Sorbus aucuparia*, entre les

feuilles liées. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W.); Salquenen (de R.).

Nanella Hb. 267. **Pruniella** Hb. 268.

Ch. en mai et juin sur le poirier et l'aubépine, mangeant les fleurs et les jeunes pousses; aussi dans les lichens des arbres fruitiers. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sierre, Salquenen (de R.).

Gen. Ptochenusa Hein 1870.

Subocellea Steph. Ill. IV, 214. **Internella** Z. **Dissonella** HS.

Ch. d'août en octobre sur *Origanum vulgare* dans un fourreau formé des fleurs et des semences. Pap. de juin en août. Rare. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); au-dessus de Plan-Cerisier.

Gen. Argyritis Hein. 1870.

Pictella Z. Is. 1839, 202. **Germarella** Nolk.

Ch. en mai, puis en septembre sur *Cerastium triviale*, dans des galeries soyeuses sur les tiges et dans les racines. Pap. en avril, puis de juin en août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire, Salquenen.

Libertinella Z. Stt. e. Z. 1862 p. 112. **Superbella** Frey.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région alpine jusqu'à plus de 2000 m. Alpes du Haut-Valais (A.).

Gen. Chrysopora Clem. 1860.
(Nannodia Hein. 1870).

Stipella Hb. 138.

Ch. en juin, puis d'août en octobre sur *Atriplex*, *Chenopodium*, dans les feuilles. Pap. de mai en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sierre.

a) var. **Næviferella** Dup. Sup. IV. 85, 4. Plus foncé, ailes antér. avec les taches d'un rouge doré, réduites à deux petites lignes. Avec le type, mais très rare.

Eppelsheimi Staud. Stt. e. Z. 1885 p. 351.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. Haut-Valais (A.).

Hermannella F. Sp. 509. **Zinckeella** Hb.

Ch. de juin en octobre sur *Atriplex*, *Chenopodium*, en société dans des nids. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Gen. Apodia Hein. 1870.

Bifractella Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 66.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Conyza squarrosa*, *Pulicaria dysenterica*, sur les semences, hiverne adulte et se chrysalide dans le capitule. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); près de Tourtemagne.

Gen. Sitotroga Hein. 1870.

Cerealella Oliv. Enc. Méth. Ent. I, 121. **Pyrophagella** Koll.

Ch. toute l'année dans les greniers et magasins à céréales. Pap. de mai en juillet. Commun partout. Martigny, etc.

Gen. Brachmia (Hb. 1818) Meyr.

Triannulella HS. 458, V. p. 201. *Sepiella* Staud.

Ch. en mai et juin, puis en août sur *Convolvulus sepium* et *arvensis*, entre les feuilles liées en forme de siliques. Pap. en juin et juillet, puis en septembre et octobre. Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais (A.); environs de La Croix (W.); Salquenen (de R.).

Gen. Rhinosia Tr. 1833.

Sordidella Hb. 229.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare et monte assez haut dans la région des pâturages. Zmutt, Zermatt (Fr.); La Forclaz, glacier de Trient.

Ferrugella Schiff. S. V. 142. *Coriacea* Hb.

Ch. en mai et juin sur *Campanula* et *Scabiosa*, entre des feuilles liées en forme de siliques. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région sous-alpine. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Formosella Hb. 160. *Flammella* Tr.

Ch. en avril et mai sur *Campanula*. Pap. en juin et juillet. Rare et ne monte pas très haut. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W.); Salquenen (de R.).

Gen. Paltodora Meyr. 1894 (Cleodora Curt.).

Anthemidella Wck. Cat. ed. II. p. 301. *Striatella* HS.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Anthemis*, *Chrysanthemum*, dans les capitules. Pap. de juin en août. Rare. Haut-Valais (A.).

Cytisella Curt. B. E. XIV, 671. *Fuscipennis* West.

Ch. en mai dans les tiges de *Pteris aquilina*. Pap. en juillet et août. Rare. Régions forestière et sous-alpine. Furka (Lah.); Haut-Valais (A.); Salvan.

Gen. Ypselophus (F. 1798) Z.

Fasciellus Hb. 111.

Ch. en septembre et octobre sur *Prunus spinosa*, *Rubus fruticosus*, dans des feuilles roulées. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire (W. et F.) ; Salquenen (de R.).

Limosellus Schläg. Ber. 1849, 43. Deflectivellus HS.

Ch. en mai et juin sur *Trifolium pratense*, *Fragaria vesca*, *Lotus*, *Scabiosa arvensis*, entre des feuilles roulées. Pap. en juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny, coteau de Ravoire.

Schmidiellus Heyd. Is. 1848, 954. Quadrinellus HS.

Ch. en juin dans les feuilles roulées de l'*Origanum vulgare*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région chaude. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier.

Juniperellus L. F. S. N^{ro} 1449.

Ch. d'avril en juin sur le génévrier. Pap. en juin et juillet. Rare. Coteaux de la région inférieure et jusqu'à 2000 m. dans les alpes. Mt-Chemin (F.) ; Gruben en 1904 (de R.).

Gen. Nothris Hb. 1818.

Marginella F. Sp. 307, 8. Striatella Hb. Clarella Tr.

Ch. d'avril en juillet sur le génévrier dans des nids sur les pousses. Pap. de juin en août. Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoire près de la Croix des vignes (F.) ; Salquenen, en juin 1905 (de R.).

Verbascella Hb. 98.

Ch. de mars en avril en société dans les pousses de divers *Verbascum*. Pap. de juin en août. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny (W. et F.) ; Salquenen, Grimentz (de R.).

Obscuripennis Frey Lep. d. Schw. 372.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Sabinella Z. Is. 1839, 190.

Ch. en juin sur *Juniperus Sabina*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région montagneuse. Haut-Valais (A.); sur le Simplon (F.); Salquenen en mars 1905 (de R.).
Obs. Est-ce qu'il y aurait deux générations ?

Asinella Hb. 166. *Aurorella* Frey Mitth. VI, p. 365.

Ch. inconnue. Pap. d'octobre en avril suivant. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W. et F.); Salquenen en été 1902 (de R.).

Gen. Sophronia Hb. 1818.

Semicostella Hb. 396. *Parenthesella* Hw. 540.

Ch. sur *Thymus* et *Rumex acetosa*. Pap. en juin et juillet. Commun dans la région alpine de 1500 à 2000 m. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, La Forclaz, Salquenen.

Humerella Schiff. S. V. 137.

Ch. en mai et juin sur *Thymus Serpyllum*, *Artemisia campestris* et *vulgaris*, *Gnaphalium arenarium*, entre les feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Scariella Z. Is. 1839. 189.

Ch. en mai sur *Artemisia campestris*. Pap. en juin et juillet. Rare. Environs de Gamsen (A.).

Gen. Anarsia Z. 1839.

Spartielliella Schrk. Fn. B. II, 104. *Genistæ* Stt.

Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur *Cytisus*, *Genista*, *Spartium*, etc. dans les pousses. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Région forestière Haut-Valais (And.); près de Montana.

Lineatella Z. Is. 1839, 190. Pullatella Hb.

Ch. de mars en mai, puis en juillet et août dans les jeunes pousses et dans les fruits de l'amandier, du cerisier et du prunellier. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sion.

Gen. Symmoca Hb. 1818.

Signella Hb. 211.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. La ♀, que ses ailes plus petites et pointues et son grand abdomen empêchent presque de voler, est beaucoup plus rare encore que le ♂. Assez rare et un peu partout dans les hauts pâturages des alpes jusqu'à plus de 2000 m., contre les rochers. Près de Gamsen (A.) ; Zermatt.

Albicanella Z. Stt. e. Z. 1868, 136. Signella HS.

Ch. dans un fourreau sur les mousses des rochers calcaires. Pap. en mai et juin. Contre les rochers. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny, Ganter.

Signatella HS. 380.

Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Contre les troncs des tilleuls. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R).

Gen. Oegoconia Stt 1854.

Quadripuncta Hw. Lep. Br. 557. Bifasciella Steph. Deauratella HS.

Ch. inconnue. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans les maisons, etc. Haut-Valais (A.) ; Sion, Sierre, Martigny, Salquenen.

B. Blastobasinæ.

Gen. *Endrosis* Hb. 1818.

Lacteella Schiff. S. V. 139. *Betulinella* Hb. 20.

Ch. pendant toute l'année dans le bois pourri, les champignons, le papier, le blé, la farine, les bouchons à vin, etc. Pap. toute l'année. Commun partout et nuisible. Martigny, Salquenen, etc.

Gen. *Blastobasis* Z. 1855.

Phycidella Z. Is. 1839, 193.

Ch. inconnue. Pap. de mai en août. Assez rare. Il vole autour des rosiers, des chênes et de l'aubépine. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, Martigny, Salquenen.

Gen. *Hypatima* (Hb. 1818) HS.

Binotella Thb. Diss. Ent. VII, 106. *Mouffetella* Hb. 245.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Contre les conifères habillés de lichens Haut-Valais (And.); Mt-Chemin (F.); au-dessus et au nord de Salquenen dans les forêts de mélèzes (de R.).

C. Oecophorinæ.

Gen. *Pleurota* Hb. 1818.

Schlægeriella Z. Thür. Ber. 1847. 239.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare; il vole autour de *Tanacetum* et de *Carlina vulgaris*. Haut-Valais (A.).

Aristella L. S. N. ed. XII, 894. Bitrabcicella Tr.

Ch. sur diverses plantes basses. Pap. de mai en août.
Très rare. Dans les environs de Martigny (W).

Bicostella Cl. lc. 3, 15. Bipunctella Hb. Vög. 96

Ch. en octobre et novembre sur *Calluna vulgaris* dans un nid entre les tiges. Pap. de mai en juillet.
Rare, mais partout où pousse le *Calluna*, soit endroits marécageux, soit collines sèches et rocheuses. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire.

Gen. Holoscolia Z 1839.

Forficella Hb. 343. Proboscicella Sulz.

Ch. d'octobre en mai suivant sur *Rhamnus*, *Betula*, *Corylus*, *Quercus*, *Salix*, etc. sous l'écorce des troncs pourris. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région inférieure. Près de Gamsen (A.); environs de Martigny.

Gen. Dasystoma Curt. 1833.

Salicella Hb. 9. Rufocrinitalis Zett. Ins. Lap. 975.

Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur *Salix caprea* et *purpurea*, *Berberis*, *Cornus*, *Betula*, *Alnus*, etc., entre des feuilles liées ensemble. Pap. en avril et mai. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); La Croix près de la Dranse, Martigny, Sierre, Salquenen.

Gen. Chinabache (Hb 1818) Z.

Phryganella Hb. 10. Novembris Hw.

Ch. de juin en août sur l'aune, le hêtre et le chêne.
Pap. en septembre et octobre pour reparaitre au printemps suivant. Assez commun dans la région inférieure. Martigny, Branson, Follatères, Plan-Cerisier.

Fagella F. Mant. II, 244, 42.

Ch. en juillet et août sur beaucoup d'arbres forestiers, surtout sur le chêne. Pap. en mars et avril. Très commun dans les environs de Martigny, Branson, Salquenen, Sierre, Sion, etc.

a) **ab. Dormoyella** Dup. XI, 287. Ailes antér. plus foncées Haut-Valais (A.).

Gen. Semioscopis Hb. 1818

Anella Hb. 28. Alienella Tr.

Ch. de juin en août sur le bouleau, le tremble, etc. Pap. de mars en mai. Rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier (W.).

Strigulana F. Mant. II, 233, 79. Atomella Hb.

Ch. de juin en août sur le bouleau, le tremble, etc. Pap. de mars en mai. Rare. Dans la région inférieure. Près de la Dranse à La Croix (W.).

Avellanella Hb. Vög. 65.

Ch. comme la précédente. Pap. de mars en mai. Rare. Haut-Valais (A.).

Gen. Epigraphia Steph. 1829.

Steinkellneriana Schiff. S. V. 130. Charactella Hb.

Ch. de juin en août et septembre sur *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus*, *Crataegus*, *Prunus spinosa*, etc. Pap. en avril et mai. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin (F.); Salquenen en mars 1903 (de R.).

Gen. Psecadia Hb. 1818.

Sexpunctella Hb. 304.

Ch. en mai et juin sur *Echium vulgare*, dans les fleurs. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Pusiella Rœm. Gen. Ins. 22. *Lithospermella* Hb.

Ch. en mai et juin sur *Pulmonaria officinalis*, *Lithospermum*, *Lychnis viscaria*, *Silene*, *Armeria*, en société. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); Branson, Sion, Sierre, Salquenen, Stalden.

Bipunctella F. S. E. 668, 7. *Echiella* Hb.

Ch. de juillet en octobre sur les fleurs de l'*Echium vulgare*. Pap. d'avril en juin. Assez rare et seulement dans la région chaude. Haut-Valais (A.); au-dessus de Plan-Cerisier, La Croix, Stalden, Ganter, Saillon, Sierre, Sion, Salquenen.

Funerella F. Mant. II, 247, 74.

Ch. de juillet en septembre sur *Pulmonaria officinalis*, *Symphytum officinale*, *Lithospermum*, *Myosotis palustris*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Decemguttella Hb. 303.

Ch. d'août en octobre sur *Lithospermum officinale*, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Autour de Salquenen (de R.).

Pyrausta Pall. Reis. I, 176 (1871). *Atropunctella* Thb.

Ch. de juin en octobre sur *Thalictrum aquilegifolium*. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Près du château de la Bâtiaz; dans les terres incultes autour des vignes de Martigny (W. et F.); Salquenen, Bois de Finges (de R.).

Aurifluella Hb. 302. *Pyrausta* Hb. *Pyraustella* Dup.

Ch. en mai et juin dans les gros capitules des charbons et non sur *Thalictrum foetidum*, selon que le disent certains auteurs. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région chaude. En Valais (Reb.); Martigny, Fully, Salquenen.

Gen. Dopressaria Haw. 1812.

Costosa Hw. Lep. Br. 508. Spartiana et Depunctella Hb.

Ch. en juin et juillet sur *Genista tinctoria*, *Spartium scoparium*, *Cytisus alpinus*, etc. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région forestière. Au-dessus de La Croix, Plan-Cerisier.

Irrorata Staud. Hor. VII, 1870, 241. Anthricella Br.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (A.).

Flavella Hb. 97. Sparmanniana Wd. Litarella Z.

Ch. en mai et juin sur diverses Centaurées, au bout des feuilles roulées. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); La Croix (W.); Salquenen (de R.).

a) var. **Sparmanniana** F. E. S. 3. 2. 285, 175. Bipunctosa, Stt. Pallorella HS. Ailes antér. plus pâles, plus densément écaillées de noir à l'extérieur. Haut-Valais (A.).

Pallorella Z. Is. 1839, 195. Sparmaniella HS.

Ch. en juin et juillet sur *Centaurea Jacea*, et *Scabiosa*, *Lappa*, *Serratula*, etc. Pap. de juillet en septembre. Assez rare. Région inférieure. La Croix (W.); Salquenen en mars 1905 (de R.). *Obs.* Est-ce que le papillon aurait passé l'hiver ?

Prostratella Const. An. S. Fr. 1884, p. 215, t. 9. f. 12.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure. Environs de Martigny.

Assimilella Tr. IX, 1. 259; X, 3, 185.

Ch. de mars en mai sur *Genista*, *Spartium*, etc., dans un nid entre les branches. Pap. de juillet en septembre. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); La Croix.

Putridella Schiff. S. V. 138. *Peucedanella* Mill.

Ch. en avril et mai sur *Peucedanum officinale* dans des feuilles roulées. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); près de Sierre.

Petasitis Stdf. (sen.) Bresl. e. Z. 1851, 59. *Petasitæ* Hein.

Ch. en mai et juin sur *Petasites alba* et *viridis*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure et jusqu'à 1200 m. Environs de Martigny.

Arenella Schiff. S. V. 137. *Gilvella* Hb.

Ch. de mai en août sur *Lappa*, *Carlina*, *Sonchus*, *Cirsium* et *Centaurea* divers. Pap. de l'automne au printemps. Pas rare. Dans la région inférieure et jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.); La Croix (W.); Salquenen (de R.).

Propinquella Tr. X, 3. 184. *Yeatiella* Hb. 418.

Ch. de juin en août sur *Lappa*, *Cirsium lanceolatum* et *arvense*. Pap. de juillet en septembre. Assez rare. Région inférieure et jusqu'à 1600 m. Environs de Martigny, Salquenen.

Subpropinquella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 156. *Heracliella* Dup., *Sublutella* Stgr.

Ch. en mai et juin sur *Carduus*, *Centaurea*, *Cirsium lanceolatum*, en dessous des feuilles. Pap. de juin en septembre. Rare. Région des cultures. Haut-Valais (A.); Branson.

Laterella Schiff. S. V. 137. *Heraclella* Hb., *Heracliella* Tr.

Ch. en mai et juin sur le bluet des champs. Pap. de juillet en septembre. Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Carduella Hb. 439.

Ch. en mai et juin sur *Carduus*, *Cirsium acaule* et *lanceolatum*. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais (A.); Salquenen, Viège.

Zephyrella Hb. 414-5. *Capreolella* HS. *Granulosella* Stt.

Ch. en juin et juillet sur *Chærophyllum sylvaticum* et *bulbosum*, dans des feuilles roulées. Pap. en août et septembre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny; Salquenen en février et mars 1905 un grand nombre d'exemplaires (de R.).

Thapsiella Z. Is. 1847, 838. *Thapsia* HS, *Feruliphila* Mill.

Ch. en avril sur *Apium nodiflorum*, etc. Pap. en juin. Très rare. Dans la région chaude inférieure. La Croix, Salquenen.

Yeatiana F. Sp. II, 286, 60. *Ventosella* Reut., *Atricornella* Mn.

Ch. inconnue. Pap. d'août en octobre, volant autour de *Clematis*. Rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, près du château de la Bâtiaz, Salquenen.

Ocellana F. S. E. 652, 40. *Signella* Hb., *Charactrella* Tr.

Ch. en mai et juin sur les jeunes pousses de *Salix capræa*, *alba*, *cinerea*, *purpurea*, *viminialis*, *Betula* et *Quercus*, dans des feuilles roulées. Pap. de juillet en novembre. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); à La Croix de Martigny-Combe, Salquenen.

Alstrømeriana Cl. Ic. 10, 1. *Puella* Hb.

Ch. en juillet et août sur *Conium maculatum*, etc. Pap. de l'automne au printemps. Assez commun. Dans la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, La Croix.

Purpurea Hw. Lep. Br. 511. *Vaccinella* Hb.

Ch. de mai en juillet sur *Daucus Carota*, *Tormentilla erecta*, etc. Pap. d'août en octobre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sion.

Liturella Hb. 83. *Hypericella* Tr.

Ch. en mai et juin sur *Hypericum perforatum*, etc. dans des feuilles roulées. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); environs de La Croix.

Conterminella Z. Is. 1839, 196. *Hypericella* Hb.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région chaude. Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

Applana F. Gen. 294. *Cicutella* Hb. 79, 419.

Ch. de mai en juillet sur divers *Chærophylum*, *Daucus Carota*, *Heracleum*, et autres Ombellifères. Pap. de juillet en octobre. Assez commun partout dans la région inférieure, mais ne monte pas jusque sur les hautes alpes. Haut-Valais (A.); La Croix, Salquenen.

Ciliella Stt. Cat. 17. *Annexella* Z.

Ch. en juillet et août sur une masse d'Ombellifères: *Angelica*, *Heracleum*, etc., sur les feuilles et sur les fleurs. Pap. en août et septembre. Rare. Dans la région inférieure et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Martigny et ses alentours.

Nodiflorella Mill. Ic. II, 214, t. 73, 8-11.

Ch. en mars et avril dans des nids sur des Ombellifères: *Apium nodiflorum*, etc. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région chaude inférieure. La Croix (W.); Salquenen (de R.).

Angelicella Hb. 337. *Rubidella* Dup.

Ch. de mai et juin sur une foule d'Ombellifères: *Angelica*, etc., dans les pousses et les rameaux. Pap. en juillet et août. Assez rare. Région inférieure et jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.).

Cnicella Tr. IX, 1, 237.

Ch. en mai et juin sur *Eryngium campestre*, etc., en société sur des jeunes plantes. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.).

Parilella Tr. X, 1. 178. *Humerella* Dup.

Ch. en juin et juillet sur une foule d'Ombellifères: *Peucedanum oreoselinum*, etc. Pap. de juillet en septembre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.).

Depressella Hb. 407. *Bluntii* Curt

Ch. en juillet et août sur une masse d'Ombellifères: *Daucus Carota*, etc., dans des galeries filées dans les ombelles. Pap. en août et septembre. Rare. Région inférieure et jusqu'à 1200 m. Environs de La Croix, coteau de Ravoire, Salquenen en février et avril 1905, deux ex. (de R.).

Pimpinellæ Z. Is. 1839, 195.

Ch. sur les ombelles de *Pimpinella Saxifraga*. Pap. en mars. Très rare. Dans la région chaude inférieure. Deux ex. de Salquenen en 1905 (de R.).

Daucivorella Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 106.

Ch. en juin et juillet sur Ombellifères: *Daucus Carota*, etc. Pap. en août et septembre. Rare. Région inférieure. Coteau de Ravoire, Plan-Cerisier.

Emeritella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 167.

Ch. en juin et juillet sur *Tanacetum vulgare*, dans des feuilles roulées. Pap. en juillet et août. Pas commun. Région sous-alpine. Haut-Valais (A.).

Albipunctella Hb. 149.

Ch. en juin et juillet sur Ombellifères: *Chærophylum*, etc. Pap. de juillet en septembre. Rare. Dans la région inférieure et les sous-alpes. Environs de Martigny, Salquenen (de R.).

Weirella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 165, t. 17, fr. 8.

Ch. en mai et juin sur Ombellifères: *Anthriscus*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. La Croix.

Pulcherimella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 164, t. 17, f. 8.

Ch. en mai et juin sur Ombellifères : *Pimpinella*, etc. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région inférieure. La Croix.

Chærophylli Z. Is. 1839, 136.

Ch. sur les fleurs de *Chærophyllum bulbosum*. Pap. en été. Assez rare. Dans la région chaude. Stalden, par l'élevage d'une toute grande famille de chenilles qui vivaient en juin 1868 sur une grande ombellifère, et dont l'éclosion eut lieu en juillet de la même année (de R.).

Absinthiella HS. Corr. XIX. 1865 p. 115. ? *Anchusella* Now.

Ch. en mai et juin sur l'Absinthe, entre les jeunes pousses roulées. Pap. en juillet et août. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sierre.

Absinthivora Frey Lep. der Schw. p. 335.

Ch. en mai et juin sur *Artemisia campestris*. Pap. en automne et printemps. Assez rare. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.) ; Branson, coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier.

Artemisiæ Nick. Wien. Mots. 1862, 4 ? *Sordidatella* Tngstr.

Ch. en mai et juin sur *Artemisia campestris*. Pap. en juillet et août. Pas commun. Dans la région inférieure. Branson, La Croix.

Heydenii Z. L. E. IX, 266.

Ch. en mai et juin sur les Ombellifères : *Heracleum*, etc., pendant le jour, sous les pierres et jusque sous les bouses de vache desséchées. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région alpine, jusqu'à plus de 2400 m. Haut-Valais (A.) ; Bovine, Arpille, au col de Balme, au glacier de Trient, près du glacier de Moiry, etc.

Nervosa Hw. Lep. Br. 506, *Apiella* Hb , *Daucella* Tr.
Ch. de mai en juillet sur Ombellifères : *Carum Carvi*
et *Bulbocastanum*, etc. Pap. de juillet en septembre. Rare.
Région inférieure. Martigny, Fully.

Gen. *Enicostoma* Steph. 1834.

Lobella Schiff. S. V. 138. *Lugubrella* Dup.
Ch. d'août en octobre sur *Prunus spinosa* dans des
feuilles roulées. Pap. en mai et juin. Très rare. Dans
la région inférieure Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire,
environs de La Croix.

Gen. *Anchinia* Hb. 1818.

Daphnella Hb. 81. *Pudorella* Hb. Vög. 90.
Ch. en mai et juin sur *Daphne Mezereum*, dans les
feuilles. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la
région sous-alpine jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A.);
Sion-les-mayens, Ponchette, près des ruines de l'Hôtel
Weisshorn à Gruben (de R.).

Gen. *Hypercallia* Steph. 1829.

Citrinalis Sc. Ent. Car. N^{ro} 609. *Christiannana* L.
Ch. en mai et juin sur *Polygala Chamæbuxus* dans
un nid sur les jeunes pousses. Pap. en juin et juillet.
Assez rare, mais un peu partout depuis le bas jusqu'à
2500 m. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Sion,
Sierre, derrière La Bâtiaz, Salquenen.

Gen. *Carcina* Hb. 1818.

Quercana F. S. E. 652, 39. *Fagana* Schiff., *Cancellata* Hb.

Ch. en mai et juin sur *Fagus*, *Quercus*, *Pyrus*, *Prunus*, *Rubus*, dans de légers nids en dessous des feuilles. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, coteau de Ravoire, Salquenen.

Gen. Harpella Schrk. (Peltophora Meyr.).

Forficella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 338. *Majorella* S. V., *Proboscidea* Sulz.

Ch. d'octobre en mai suivant sur *Rhamnus*, *Betula*, *Corylus*, *Quercus*, *Salix*, sous l'écorce des troncs pourris. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Près Gamsen (A.); coteau de Ravoire, Branson, Stalden, Salquenen.

Gen. Alabonia (Hb. 1818) Wlsglm.

Geoffrella L. S. N. XII, 896. *Cramerella* Cr.

Ch. probablement comme la précédente. Pap. de mai en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Sur le Simplon (Bent.)

Bractella L. S. N. X, 540. *Bracteella* Hb., *Druyella* Cr.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Alnus*, *Pyrus*, *Quercus*, sous les écorces des bois pourris. Pap. en juin et juillet. Rare et ne monte pas très haut. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, Salquenen, Vissoie.

Gen. Oecophora Latr. 1706 (Dasycera Hw.).

Sulphurella F. S. E. 670, 19. *Orbonella* Hb., *Olivella* Wd.

Ch. d'août en mars suivant sous l'écorce des troncs pourris : *Acacia*, etc. Pap. en avril et mai. Assez rare. Dans la région sous-alpine. Zermatt (Frey).

Oliviella F. E. S. III. 2. 216, N^{ro} 132. *Aemulella* Hb., *Sulphurella* Wd.

Ch. d'août en mai suivant sous l'écorce des troncs de chênes pourris. Pap. de juin en août. Très rare. Dans la région inférieure. Gamsen (A.) ; Viège (Bent.) ; Sion, Sierre (Paul) ; coteau de Ravoire, Branson (W. et F.) ; Salquenen en mai 1905 (de R.).

Gen. Borkhausenia Hu. 1818. (Oecophora auct.).

Unitella Hb. 147. *Fuscoaurella* Hw., *Arietella* Z.

Ch. de septembre en mai suivant sous l'écorce des arbres morts et dans la mousse. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Martigny.

Flavifrontella Hb. 126.

Ch. de septembre en mai suivant sur les troncs pourris du hêtre. Pap. en mai, juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Martigny.

Pseudospretella Stt. Cat. 14.

Ch. de septembre en mai suivant dans les pois et autres fruits secs. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans les greniers, etc. Haut-Valais (A.) ; Martigny.

Nubilosella HS. 640, V p. 138.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet, contre les pins. Assez rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; coteau de Ravoire, Mt-Chemin.

Stipella L. S. N. X, 539. *Sulphurella* Hb., *Tigrella* Hb.

Ch. de septembre en avril suivant, sous les écorces des conifères pourris. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région des conifères. Zermatt (Frey) ; Mt-Chemin, La Forclaz ; Salquenen, val de Tourtemagne (de R.).

Similella Hb. 182.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la forêt au-dessus et au N. de Salquenen, jusqu'à 1500 m. (de R.).

Rhætica Frey Lep. der Schw. 375. Engadinella HS.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans la haute région alpine. Hautes alpes du Valais (Frey), un seul ex. du Valais (de R.).

Augustella Hb. 177. Mæstella H. G. 465; Angustella Wd.

Ch. de septembre en avril suivant sous les écorces des bois pourris de peupliers, poiriers et ormes. Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Luctuosella Dup. XI, 312. Funestella Dup., Albimaculea Hw.

Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (A.).

Jourdheuillella Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 73.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. En Valais (Reb. Cat.).

Minutella L. S. N. X, 537. Oppositella Hb.

Ch. d'août en avril suivant sur *Apium graveolens*, dans les graines. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans les habitations, etc. Martigny, Salquenen.

Formosella F. Mant. II, 257, 39.

Ch. de septembre en avril suivant dans le bois pourri du peuplier. Pap. de juin en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, Salquenen.

Lunaris Hw. Lep. Br. 556. Metznerella Tr., Begrandella Dup.

Ch. de septembre en avril suivant sur les lichens des palissades. Pap. de mai en juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

Lambdella Don. Nat. Hist. II, t. 57. Metzneriella HS.

Ch. inconnue. Pap. d'avril en juin sur les buissons secs de *Sarothamnus*. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Environs de Martigny.

Leucochrysella Mill. An. S. Fr. 1854, 61, t. 3.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans la région des conifères. Clairières près du Ban des Aiguilles sur le Mt-Chemin, Gottra (F.); Martigny en mai (de R.).

X. ELACHISTIDÆ.

A. Scythridinæ (Butalinæ).

Gen. Epermenia Hb. 1818. (Chauliodus).

Illigerella Hb. 333. Falciformis Hw.

Ch. entre les feuilles ds l'*Aegopodium podagraria*. Pap. en juin et juillet. Rare. Valais (de R.).

Scurella HS. 968, V. p. 208.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Assez répandu, mais jamais commun. Dans les forêts élevées de la région alpine jusqu'à 2400 m. Riffelberg (Fr.); La Forclaz; près de l'hôtel de la Pierre-à-voir (F.); haut de la forêt de Meiden, etc. dans la vallée de Tourtemagne (de R.).

Pontificella Hb. 181.

Ch. en août et septembre sur *Thesium montanum*, *Sarothamnus scoparius*. Pap. en mai et juin. Rare. Région sous-alpine, pas au-dessus de 700 m. Haut-Valais (A.); sur le Simplon.

Dentosella HS. 767, V. p. 208. Iniquellus Wck.

Ch. en mai sur les feuilles du *Peucedanum Oreoselinum*. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.); Sierre.

Gen. Scythris Hb. 1818.
(Galanthia Hb., Butalis Tr.).

Amphyncella H. G. 473. Viridatella HS.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Un peu partout dans les plus hauts pâturages, aux dernières limites de la végétation. Gornergrat (Frey); sur le Simplon.

Fallacella Schläg. Ber. 238. *Armatella* HS.

Ch. de septembre en avril suivant dans un nid allongé sur *Helianthemum vulgare*. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Sous-alpes et alpes jusqu'à 2100 m. Haut-Valais (A.); sur le Simplon.

Ericetella Hein. Tijds. XV, 1872 p. 280.

Ch. sur la bruyère. Pap. au printemps et en été. Il vole sur les fleurs de la bruyère, dans les coteaux de la région moyenne et dans les sous-alpes jusqu'à 1600 m. Grimentz, etc. (de R.).

Speyeri Hein. Wck. 445.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. En Valais (Rebel Cat.).

Glacialis Frey Mitth. III, p. 254. (1870).

Ch. et chrys. sous les pierres des cols des hautes alpes. Cette dernière est d'un brun noirâtre, légèrement aplatie, retenue à la pierre par un fil soyeux très lâche; on en trouve en général 3 ou 4 à côté l'une de l'autre. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la haute région alpine jusqu'à 2500 m. et plus. Riffelberg près Zermatt (Frey); Pas de la Forclettaz, col de Torrent, etc. (de R.).

Palustris Z. L. E. X, 217.

Ch. inconnue. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (A.).

Restigerella Z. Is. 1839, 193.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Région inférieure et dans les sous-alpes. Environs de Martigny, Mt-Chemin.

Scopolella Hb. 246. *Triguttella* Dup.

Ch. en avril et mai sur *Prunus spinosa*, sur les branches fortement recouvertes de mousse et de lichen, aussi sur *Geranium sanguineum*, et surtout sur *Sedum album*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région chaude inférieure et les sous-alpes. Furka et Domodossola (Lah.); Haut-Valais (A.); au-dessus de Plan-Cerisier, (W.); Salquenen (de R.).

Chenopodiella Hb. 320. *Tristella* Tr. *Cylindrella* Steph.

Ch. de mai en juillet sur *Atriplex* et *Chenopodium* dans un nid léger. Pap. de juin en septembre. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.); environs de La Croix.

Dissimilella HS. 989.

Ch. en avril et mai sur *Helianthemum vulgare*, dans un nid en forme de galerie à la racine. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W.); Salquenen (de R.).

B. Momphinæ (Laverninæ).

Gen. Capaplectica Wlsgh. 1894.
(Heydenia Hofm. 1868).

Fulviguttella Z. Is. 1839, 193. *Minutella* Steph. *Flavimaculella* Stt.

Ch. en septembre dans les semences d'une foule d'Ombellifères: *Angelica*, etc. Pap. de juin en août. Rare. Haut-Valais (A.).

Gen. Cosmopteryx Hb. 1818.

Eximia Hw. Lep. Br. 532. *Drurella* Stt. *Druryella* HS.

Ch. de juillet en septembre sur le houblon dont elle mine les feuilles. Pap. en juin. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.); environs de Sion et de Sierre (P.).

Druryella Z. Stt. e. Z. 1850, 196. *Orichalcea*. Stt.

Ch. en août et septembre sur *Vicia sepium*, etc. dont elle mine les feuilles. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Région des cultures. Environs de Gamsen (A.); Salquenen (de R.).

Gen. Batrachedra Stt. 1854.

Præangusta Hw. Lep. Br. 530. *Turdipennella* Tr.

Ch. en mai et juin sur le tremble, d'abord dans les bourgeons et ensuite dans des feuilles liées ensemble. Pap. de juin en août. Rare Haut-Valais (A.).

Gen. Pyroderces Z. 1853.

Argyrogrammos Z. Is. 1847, 37.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Carlina*. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Gen. Stathmopoda Stt. 1854.

Pedella L. F. S. N^{ro} 1493. *Angustipennella* Hb.

Ch. d'août en octobre dans les fruits d'*Alnus glutinosa*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Ecône; Salquenen où il vole en grand nombre sur les aunes des bords du Rhône (de R.).

Gen. Ochromolepis Hb. 1818.

Ictella Hb. 361. *Ictipennella* Tr.

Ch. de mars en mai sur *Thesium pratense* et *montanum* dans un nid sur les pousses. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région alpine. A la Gemmi (Rothb.)

Gen. Cyphophora HS. 1853.

Idæi Z. Is. 1839, 211.

Ch. en avril et mai sur *Epilobium angustifolium* et *Rubus*, en société dans les racines. Pap. en mai et juin.

Assez rare. Dans la région sous-alpine jusqu'à 1200 m. Clairière près du Ban des Aiguilles sur le Mt-Chemin (F.) ; Grimentz (de R.).

Gen. Blastodacna Wch. 1877.

Hellerella Dup. XI, 899, 11. Atra Hw. Putripennella Z.

Ch. sous les lichens des troncs de pommier, parfois sous l'écorce des arbres morts ou malades, aussi dans les fruits de l'aubépine. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Salquenen (de R.).

Gen. Mompha Hb. 1818 (Laverna Curt.).

Conturbatella Hb. 540.

Ch. en mai et juin sur *Epilobium angustifolium* dont elle file ¹⁾ les pousses. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les sous-alpes et alpes jusqu'à 1600 m. et plus. Clairière du Ban des Aiguilles sur le Mt-Chemin.

Decorella Steph. III. IV, 210. Gibbiferella Z.

Ch. dans les nœuds des tiges de l'*Epilobium hirsutum*. Pap. en automne. Très rare. Dans la région forestière. Salquenen (de R.).

Subbistrigella Haw. 581. Permutatella HS.

Ch. sur les semences de l'*Epilobium angustifolium* et *montanum*. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans la région forestière. Deux ex. de Salquenen (de R.).

Miscella Schiff. S. V. 142. Staintoni Sirc.

Ch. en mars et avril, puis en juin et juillet sur *Helianthemum vulgare* dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Plaine et alpes jusqu'à 2100 m. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny.

1) Faut-il lire " mine ,,.

(N. de l'éditeur).

Gen. *Limnæcia* Stt. 1851.

Phragmitella Stt. Cat. Supp. 4.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Typha latifolia* dont elle mange la moëlle à l'aisselle des feuilles basales de la plante ; plus tard, elle vit en société dans le capitule de la semence. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans les lieux marécageux de la plaine. Haut-Valais (A.); Martigny, Sion, Sierre, etc.

Gen. *Ascalenia* Wck. 1877.

Vanella (Reutti) Frey Lep. d. Schw. p. 404.

Ch. dans les bourgeons et les pousses de *Tamarix germanica*. Pap. en juin et octobre. Très rare. Dans les environs des cours d'eau où croît la plante nourricière de la chenille. Deux ex. en février à Salquenen (de R.).
Obs. Est-ce que ce papillon passerait l'hiver?

Gen. *Anybia* Stt. 1854.

Epilobiella Rœm. Berl. Schrift. Ges. Naturf. Fr. XI, 162. Niveipunctella HS.

Ch. de juillet en septembre sur les divers *Epilobium* et *Circæa lutetiana*. Pap. de septembre en avril suivant. Rare. Dans la région inférieure. Martigny.

Gen. *Chrysoclista* Stt. 1854.

Lineella Cl. Ic. 12, 8. Schæfferella Dup.

Ch. de septembre en juin suivant sous l'écorce du tilleul et du pommier. Pap. en ¹⁾

¹⁾ La phrase est restée inachevée.

(N. de l'éditeur).

Gen. Psacaphora HS. 1853.

Schranckella Hb. 264. Locupletella F.

Ch. de mai en juillet sur *Epilobium montanum* et *angustifolium* dont elle mine les feuilles. Pap. en juillet et août. Rare. Sous-alpes et alpes jusqu'à 2100 m. Haut-Valais (A.) ; La Forclaz, sur le Simplon.

Terminella Westw. Br. M. II, 216. Chrysargyrella HS.

Ch. d'août en octobre sur *Circaea lutetiana* dont elle mine les feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; Vernayaz.

Gen. Stigmatophora HS. 1853.

Heydeniella F. R. 88, 1. p. 256.

Ch. en août et septembre sur *Betonica officinalis*, *Stachys silvatica* dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Très rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.).

Pomposella Z. Is. 1839, 212.

Ch. en mai sur *Gnaphalium arenarium* et *Hieracium Pilosella* dont elle mine les pousses et les feuilles. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Sierre.

Serratella Tr. IX, 2, 167.

Ch. sur *Linaria*. Pap. en juin et juillet. Très rare et seulement dans la région inférieure. Un seul ex. de Salquenen (de R.).

Albiapicella HS. 979, V. p. 217.

Ch. d'août en avril suivant sur *Globularia vulgaris*, d'abord dans les fleurs et plus tard dans la tige. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.) ; Ganter près Bérisal.

Gen. Pancalia Steph. 1829.

Leuwenhœkella L. F. S. N^{ro} 1400. *Schmidtella* Tr.

Ch. en septembre, puis en juillet suivant sous l'écorce du mélèze. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Bérisal.

a) var. *Latreillella* Curt. B. E. VII p. 304.

Plus grand, avec les antennes de la ♀ le plus souvent plus épaissies par les écailles. Pap. en juillet. Rare. Plutôt dans la région haute alpine. Riffelberg (Fr.) et autres alpes valaisannes (A.) ; Bovine, Arpille, glacier du Trient (W. et F.) ; collines de Salquenen (d. R.).

D. *Coleophorinæ*.

Gen. Asychna Stt. 1854.

Modestella Dup. XI, 229. *Splendidella* Z.

Ch. de juin en août sur *Stellaria Holostea*, *Thesium montanum*, dans les capsules non mûres, dont elle se sert ensuite pour fourreau. Pap. d'avril en juin. Rare. Dans les sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; sur le Simplon.

Gen. Coleophora Hb. 1818.

Nigricornis Hein. Weck. 534.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. En Valais (Wo.).

Laricella Hb. 427. *Laricinella* Ratz.

Ch. d'octobre en mai suivant dans un fourreau gris jaunâtre sur *Pinus Larix*, dont elle mange les feuilles aciculaires. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région des conifères jusqu'à 1500 m. Mt-Chemin, La Forclaz.

Milvipennis Z. Is. 1839, 208.

Ch. de septembre en mai suivant dans un long fourreau brun et rugueux, sur *Betula* dont elle mange les feuilles. Haut-Valais (A.) ; Anniviers.

Lutipennella Z. Is. 1838, 713.

Ch. de septembre en juin suivant sur le chêne et le bouleau, dans un fourreau court, d'un jaune d'ocre brun. Pap. de mai en août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Follatères.

Limosipennella Dup. Sup. IV, 75, 4.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Alnus*, *Ulmus*, *Acer pseudoplatanus*, *Quercus*, en dessous des feuilles, dans un long fourreau brun, faiblement recourbé. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Fully.

Ocripennella Z. L. E. IV, 397.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Ballota nigra*, *Glechoma hederacea*, *Lamium album* et *purpureum*, etc. dans un fourreau gris brun. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; au pied du Mt-d'Autan.

Griphypennella Bouché Naturg. d. Ins. 131 (1834).
Lusciniæpennella Z.

Ch. sur les rosiers cultivés et les églantiers. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans les régions inférieure et forestière. En Valais (de R.).

Viminetella Z. L. E. IV, 393 not. *Orbitella* HS.

Ch. de septembre en juin suivant sur les saules, dans un fourreau plus foncé à la partie inférieure. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Salquenen.

Fuscedinella Z. L. E. IV, 383. *Politella* Scott.

Ch. de septembre en juin suivant sur *Betula*, *Ulmus*, *Crataegus*, *Corylus*, *Pyrus*, *Malus*, *Quercus*, *Alnus*, etc.,

dans un fourreau court., ridé-verruqueux. Pap. en juin et juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Aeripennis Hein. Weck. 547.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Macugnaga (Stgr.).

Aethiops Hein. Weck. 547.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Près de Macugnaga (Stgr.).

Ahenella Hein. 546.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Cornus sanguinea*, *Rhamnus frangula*, *Viburnum*. Pap. en mai et juin. Rare. Région inférieure. Martigny et ses alentours.

Albitarsella Z. L. E. IV, 378.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Glechoma hederacea*, *Origanum vulgare*, *Cytisus*, *Pulmonaria*, etc., dans un long fourreau noir, recourbé dans la partie inférieure. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen.

Alcyonipennella Koll. Btr. Land. Oestr. II, 99.

Ch. de septembre en juin suivant sur les divers *Centaurea*, dans un fourreau noirâtre, etc. Pap. de mai en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Sierre, Salquenen (de R.).

Deauretella Z. Is. 1846, 295.

Ch. en mai sur *Melilotus* et *Centaurea Scabiosa* et *Jacea*, dans un fourreau brun, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Spissicornis Hw. 537. Fabriciella Vil., Mayrella Z.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Trifolium arvense*. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région des cultures. Martigny et ses alentours.

Lixella Z. L. E. IV, 231. *Ornatipennella* Steph.

Ch. d'avril en juin sur *Thymus*, plus tard sur *Briza media* et *Holcus mollis*, dans un fourreau, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); coteau de Lens.

Ornatipennella Hb. 199.

Ch. de septembre en mai suivant sur diverses graminées, dans un fourreau d'abord jaune blanchâtre, etc. Pap. en juin et juillet. Un peu partout jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, La Croix; Salquenen en juin 1905, dans les coteaux herbeux, secs et chauds (de R.).

Ochrea Hw. Lep. Br. 533. *Argentipennella* Dup.

Ch. d'octobre en juin suivant sur *Helianthemum vulgare*, *Potentilla argentea* et *Fragariastrum*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, Branson, coteau de Ravoire.

Leucapennella Hb. 205. *Albifuscella* Z.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Silene nutans* et *Armeria*, *Lychmis viscaria*, dans les graines; la capsule vide lui sert de fourreau. Pap. en juin et juillet. Rare. Région chaude inférieure. Coteau de Ravoire, Branson, Salquenen (de R.).

Niveicostella Z. Is. 1839, 208.

Ch. en mai sur *Spartium scoparium*, *Thymus*, etc. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région forestière jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.); Sierre.

Discordella Z. L. E. IV, 301.

Ch. en mai sur *Lotus corniculatus*, dans un fourreau d'un brun foncé, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Région des prairies. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Bilineatella Z. L. E. IV, 272.

Ch. en mai sur *Genista tinctoria*, *Sarothamnus scoparius*, dans un fourreau brun. Pap. de juin et juillet. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.). Salvan.

Serenella Z. L. E. IV, 269.

Ch. en juin sur *Colutea arborescens*, *Hippocrepis comosa*, dans un fourreau gris jaunâtre, fortement recourbé. Pap. de juin en août. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); Follatères près Branson.

Rectilineella F. R. Stett. e. Z. 1843, 146.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région alpine. Environs de Zermatt (M. gen.).

Niveistrigella Hein. Wck. 564.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. En Valais (Fr.).

Nubivagella Z. L. E. IV, 309 not.

Ch. inconnue. Pap. en août. Très rare. Col de Balme (v. Heyd.).

Tractella Z. L. E. IV, 308.

Ch. inconnue. Pap. en août. Très rare. En Valais (v. Heyd.).

Valesianella Z. L. E. IV, 241. ? *Plusiella* Const.

Ch. inconnue. Pap. en juillet sur *Genista tinctoria*, dans un fourreau gris jaune fortement recourbé. Pap. en juillet et août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salvan; Salquenen (de R.).

Anatipennella Hb. 186. *Tiliella* Z.

Ch. en avril et mai sur *Tilia*, *Corylus*, *Crataegus*, *Fagus*, *Prunus Cerasus*, *domestica* et *spinosa*, *Salix capræa*, etc. dans un fourreau brun noir, en forme de pistolet. Pap. en juin et juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen, environs de Martigny.

Hemerobiella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 650. *Anseripennella* Hb.

Ch. en mai et juin sur *Crataegus*, *Prunus Cerasus*, *Pyrus com.* et *Malus*, *Sorbus aucuparia*, dans un long fourreau brun, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Auricella F. E. S. III, 2, 300.

Ch. en mai et juin sur *Betonica officinalis*, *Stachys recta*, *Teucrium Scorodonia*, dans un large fourreau d'un jaune d'ocre. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); environs de Sierre.

Onosmella Brahm. Scriba Btr. II, 133.

Ch. en juin sur *Anchusa officinalis*, *Echium vulgare*, *Onosma*, *Verbascum Thapsus*, *Artemisia campestris*, dans un fourreau gris, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); co-teau de Ravoire, Branson, Salquenen, environs de Niouc. nombreux ex. obtenus d'éclosion (de R.).

Lineolea Hw. Lep. Br. 534.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Très rare. Région inférieure. Environs de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

Therinella Tgstr. Bidr. 141. Trochilella Dup.

Ch. en mai sur *Carlina vulgaris*, *Cirsium palustre*, dans un fourreau brun, lisse et plus mince aux deux extrémités. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) environs de Martigny.

Troglodytella Dup. Sup. IV, 75. 12, Ramosella Z., Linosyridella Fuchs.

Ch. en mai et juin sur *Eupatorium cannabinum*, *Artemisia*, *Cirsium*, *Achillea*, *Solidago*, *Tanacetum*, dans un fourreau brun jaunâtre, etc. Pap. en juillet et août. Pas rare. Région inférieure et sous-alpine. Haut-Valais (A.); environs de La Croix, Martigny, Fully.

Alpicola Hein. Wck. 594.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Près de Macugnaga et au Gornergrat (Stgr.).

Linariella Z. L. E. IV, 329.

Ch. sur *Linaria*. Pap. de juin en août. Rare. Région chaude inférieure. Environs de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

Murinipennella Dup. Sup. IV, 87, 6 p. 484.

Ch. de septembre en mai sur *Luzula albida* et *pilosa* sur les graines, dans un mince fourreau brun, lisse. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, Bérissal, mayens de Sion.

Alticolella Z. L. E. IV. p. 341.

Ch. d'août en mai suivant sur *Juncus*, *Scirpus*, etc. sur les graines, dans un court et mince fourreau brun clair. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine. Sur le Simplon, Saas.

Cæspititiella Z. Is. 1839, 208. *Sternipennella* Zett.

Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Sierre et ses alentours.

Directella Z. L. E. IV, 366.

Ch. en mai et juin sur *Artemisia campestris*, dans un long fourreau cylindrique, gris. Pap. en juillet et août. Pas rare. Région des cultures. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre, etc.

Fulvosquamella HS. 912, V, p. 249.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Pas rare. Dans la région alpine, de 1200 à 2100 m. Près de Macugnaga et au Gornergrat (Stgr.).

Argentula Z. L. E. IV, 368.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Achillea Millefolium*, dans un fourreau. Pap. de juin en août. Rare. Haut-Valais (A.); au-dessus de Plan-Cerisier.

Brigensis Frey Lep. der Schw. 398.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Laripennella Zett. Ins. Lap. 1011. *Annulatella* Tgstr.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Atriplex*, *Che-nopodium*, dans les graines, dans un court fourreau d'un gris foncé, etc. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. Zermatt (Frey); Salquenen (de R.).

Flavaginella Z. Is. 1846, 295. *Punctipennella* Tgstr.

Ch. comme la précédente, dans un court fourreau gris jaunâtre, ridé. Pour se chrysalider elle s'applique contre les murs, les palissades et les arbres. Pap. en juillet et août. Pas commun. Près de Sion (Frey).

E. Elachistinæ.

Gen. **Elachista** Tr. 1883.

Magnificella Tgstr. Bidr. 148. *Geminatella* HS.

Ch. en avril et mai sur *Luzula albida* et *pilosa*, dont elle mine les feuilles. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Sierre.

Nobilella Z. Is. 1839, 213.

Ch. en avril et mai sur *Bromus*, *Festuca*, *Agrostis*, *Aira cæspitosa*, dont elle mine les feuilles. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre.

a) **ab. Subnobilella** Rössl. Verz. 278.

Avec la bande médiane interrompue. Avec le type.

Gleichenella F. Sp. 303, 81. *Trifasciella* Tgstr.

Ch. en avril et mai sur *Aira cæspitosa* et *flexuosa*, *Luzula pilosa* et une foule de *Carex*. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); environs de Sierre, Salquenen (de R.).

Albifrontella Hb. 432.

Ch. en avril et mai sur une foule de graminées dont elle mine les feuilles. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Bérisal.

Cinereopunctella Hw. Lep. Br. 582.

Ch. en avril et mai sur les *Carex* et les graminées : *Aira*, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Bérisal.

Luticomella Z. Is. 1839, 212. *Flavicomella* Stt.

Ch. en avril et mai sur *Dactylis glomerata*, dont elle mine d'abord les feuilles et ensuite les tiges jusqu'aux racines. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; environs de Sierre.

Monticola Wck. Hein 495. *Alpinella* Meyr.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Longipennis Frey Stett. e Z. 1885 p. 102 ; Mitth. VII, 259.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Perplexella Stt. Weekl. Int. 1858, 18, *Airæ* St., *Subnigrella* Frey.

Ch. en mai et juin sur *Aira cæspitosa*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Bérisal.

Nigrella Hw. Lep. Br. 583. *Aridella* Hein., *Incertella* Frey.

Ch. en avril sur *Poa nemoralis*, *trivialis*. Pap. en juin et juillet. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin.

Stabilella Frey L. E. XIII, 237.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Infuscata Frey Mitth. VI (1882) p. 373.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Spectrella Frey Stett. e. Z. 1885 p. 107.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Exiguella Frey Stett. e. Z. 1885 p. 105.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Pullicomella Z. Is. 1839, 212. *Furvicomella* HS.

Ch. d'avril en juillet sur *Avena*, *Festuca ovina*, etc.
Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Sierre.

Decolorella Hein. Wck. 491.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. En Valais (Reb. Cat.).

Reuttiana Frey L. E. XIII, 251. *Obscurella* HS.

Ch. inconnue. Pap. en avril. Rare. Haut-Valais (A.).

Bifasciella Tr. IX, 2. 182. *Binella* HS.

Ch. d'avril en juillet sur *Agrostis*, *Aira flexuosa*, etc.
Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Région sous-alpine jusqu'à 1800 m. Haut-Valais (A.); Bérisal.

Tæniatella Stt. Ann. 1857, 109.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Brachypodium sylvaticum*, *Dactylis glomerata*, etc. Pap. en mai et juin. Assez rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salquenen.

Freyi Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. A l'entrée du Weissthorpass près du glacier de Macugnaga, elle se rencontre sans doute encore ailleurs en Valais.

Albidella Tgstr. Bidr. 150. *Rhynchospora* HS.

Ch. en mai sur *Heleocharis*, *Scirpus caespitosus*, etc. dans les tiges. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans les endroits humides et tourbeux. Haut-Valais (A.).

Disertella HS. 1018, a, V p. 311. *Pollinariella* Stt.

Ch. en avril et mai sur *Brachypodium sylvaticum*, *Holcus mollis*, etc. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); environs de Sierre.

Pollinariella Z. Is. 1839, 213.

Ch. en avril sur *Avena flavescens*, *Brachypodium sylvaticum*, *Festuca ovina* et *duriuscula*. Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

Cerusella Hb. 183.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur *Arundo Phragmites*, *Phalaris arundinacea* dont elle mine les feuilles en dessous. Pap. en mai, puis en août. Rare. Dans les lieux marécageux. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sion, Sierre, Martigny, etc.

Rudectella Stt. Cat. Supp. 26.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Rufocinerea Hw. 535. Flos-lactis Hw. 535.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Poa*, *Holcus mollis*, etc. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salquenen.

Anserinella Z. Is. 1839, 213.

Ch. inconnue. Pap. en mai. Rare. Haut-Valais (A.).

Argentella Cl. Ic. 11, 13. Cynipennella Hb.

Ch. en avril et mai sur *Dactylis glomerata*, *Bromus*, *Brachypodium sylvaticum*, *Festuca*, *Koeleria cristata*, etc. Pap. de mai en juillet. Pas rare dans la seconde moitié de mai, dans la région chaude inférieure, dans les hautes herbes des coteaux exposés au midi. Haut-Valais (A.); environs de Martigny (W. et F.); Salquenen (de R.).

Pollutella HS. 1026, V. p. 313.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (A.).

Gen. Scirtopoda Wck. 1877.

Herrichiella HS. 361, V. p. 260.

Ch. de juillet en septembre sur *Lonicera Xylosteum* dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

XI. GRACILARIIDÆ.

A. Gracilariinæ.

Gen. *Gracilaria* (Hw. 1812) Z.

Alchimiella Sc. Ent. Car. N^{ro} 661. *Swederella* Thb.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre dans le bout des feuilles du chêne roulées en cornet. Pap. en mai et juin, puis d'août en octobre. Rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères près Branson.

Stigmatella F. Sp. II, 295, 34. *Upupæpennella* Hb.

Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur les peupliers et les saules, dans le bout des feuilles roulées en cornet. Pap. d'avril en juin, puis en août et septembre. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sierre.

Onustella Hb. var. *Fidella* Reutti Fn. éd. I. p. 203.

Plus obscur que le type, avec la tache costale des ailes antér. noirâtre foncé. Ch. de juillet en septembre sur le houblon, dans le bout des feuilles roulées en cornet. Pap. en septembre. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Populetorum Z. Is. 1839, 209. *Proteella* Frey.

Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur le bouleau et le tremble. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais, dans les environs de Gamsen (A.); environs de Sierre.

Elongella L. F. S. N^{ro} 1436. *Signipennella* Hb.

Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur le bouleau et l'aune, dans des feuilles roulées. Pap. en mai, puis en août et septembre. Assez rare. Région inférieure. Dans diverses localités du Valais (Bent.); environs de Martigny, (W. et F.); Salquenen (de R.).

Roscipennella Hb. 198. *Puncticostella* HS., *Juglandella* Mn.

Ch. en juin sur le noyer, dans une partie de la feuille roulée. Pap. en juillet et août. Pas rare. Dans la région des arbres fruitiers. Environs de Gamsen (A.); vallées de Viège et de Zermatt; Martigny, Branson, La Croix.

Rufipennella Hb. 204.

Ch. de juin en août sur *Acer platanoides* et *pseudoplatanus* dans des feuilles roulées. Pap. en août et septembre. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sion; Salquenen (de R.).

Limosella Z. L. E. II, 341.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Teucrium Chamædrys* dont elle mine les feuilles et où elle se chrysalide. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais, Gamsen (A.); Salquenen (de R.).

Syringella F. E. S. 3. 2. 328. *Anastomosis* Hw.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre; elle vit en société dans les feuilles de *Syringa*, *Fraxinus*, *Ligustrum*, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

Simploniella F. R. 70, 3. p. 197.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet sur le bouleau, l'aubépine et les saules. Rare. Plaine et sous-alpes. Environs de Gamsen (A.); sur le Simplon.

Phasianipennella Hb. ab. *Quadruplella* Z. L. E. II, 355. *Auroguttella* Steph. 363.

Ailes antér. marquées de quatre gouttes d'un beau jaune. Ch. de juillet en septembre sur *Polygonum persicaria*, *Rumex acetosa*, etc., dans des feuilles roulées. Pap. en septembre et octobre. Assez rare. Dans la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier.

Auroguttella Steph. Ill. IV, 274. *Lacertella* Z.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur les millepertuis, dont elle mine les feuilles. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans la région inférieure et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Sion, Sierre, etc.

Omisella Stt. Zool. 1848, 2163.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur les armoises dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en août et septembre. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Ononidis Z. Is. 1839, 209. *Ononiella* Dup.

Ch. en avril et mai sur *Ononis spinosa* et *hircina*, *Trifolium*, etc., dont elle mine les feuilles en dessous. Pap. de juin en août. Rare. Région inférieure. Environs de Gamsen (A.); Salquenen (de R.).

Kollariella Z. Is. 1839, 209.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur *Cytisus*, *Genista tinctoria*, *Spartium scoparium*, dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Scalariella Z. Stett. e. Z. 1850, 160.

Ch. en octobre et novembre sur *Echium vulgare*, dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai. Assez rare. Dans la région inférieure et les sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre.

Gen. Coriscium Z. 1839.

Cuculipennellum Hb. Gesch. VIII, Tin. VI. *Cinerea* Hw.

Ch. en juin et juillet, puis de septembre en avril suivant sur *Ligustrum vulgare*, dans des feuilles roulées en cornet. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Gen. Ornix (Tr. 1833) Z.

Guttea Hw. Lep. Br. 531. *Guttiferella* Dup.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur le pommier dans des feuilles roulées. Pap. en mai et juin, puis en septembre et octobre. Assez rare. Dans la région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.); environs de Sierre.

Interruptella Zett. Ins. Lap. 1009. *Caelatella* Z.

Ch. en août et septembre sur les saules, dans des feuilles roulées. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la haute région alpine jusqu'à 2300 m. Environs de Zermatt (Frey); Salquenen (de R.).

Pfaffenzelleri Frey, Tin 245.

Ch. en juin et juillet sur *Cotoneaster vulgaris*, dans des feuilles roulées où elle se chrysalide très souvent. Pap. en août et septembre. Pas rare, mais un peu localisé. Dans les sous-alpes jusqu'à 1600 m. Près de Zermatt (Frey).

Petiolella Frey L. E. XV, 17.

Ch. en septembre et octobre sur le pommier, minant les feuilles en dessous. Pap. en avril et mai. Assez commun. Dans la région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.); Sierre, Salquenen (de R.).

Avellanella Stt. I. B. 204. *Devoniella* Stt.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le noisetier, le bouleau, le pommier, le sorbier, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Sion.

Scoticella Stt. Tr. E. S. Lond. I, 94.? *Canella* Tgstr.

Ch. d'août en octobre sur le frêne, le bouleau et les sorbiers. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Région des arbres à feuilles jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.); Sierre, Salquenen (de R.).

B. Lithocolletinæ.

Gen. *Bedellia* Stt. 1849.

Somnulentella Z. Is. 1847, 894. *Convolvulella* Fol.

Ch. en juillet et août sur les liserons dont elle mine les feuilles. Pap. d'août en octobre. Rare. Dans la région des cultures. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, Salquenen.

Gen. *Lithocolletis* (Hb. 1818) Z.

Amyotella Dup. XI, 309. 2.

Ch. en juin, puis en septembre et octobre en dessous des feuilles sur le chêne. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. Assez rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères près Branson.

Hortella F. E. S. III, 2. 327, 174. *Saportella* Dup.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le hêtre et le chêne, en dessous des feuilles. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, au-dessus de Plan-Cerisier.

Sylvella Hw. Lep. Br. 579. *Acerifoliella* Z. 239, 32.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Acer campestre*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Geniculella Rag. Pet. Nouv. 1873. p. 346. *Acerifoliella* Z. l. c. 33.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Acer pseudoplatanus*, sous les feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.).

a) ab. *Pseudoplataniella* Rag. l. c. Ailes antér. avec des stries unicolores foncées, la 2^e strie dorsale nulle. Avec le type.

Cramerella F. E. S. III, 2, 327, 173.

Ch. comme celle d'*Hortella*. Pap. en mai et juin, puis en août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Branson, Mt-Chemin.

Heegeriella Z. L. E. I. 232, t. 1, f. 28.

Ch. en septembre et octobre sur le chêne, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Branson.

Alniella Z. L. E. I, 229. *Alnifoliella* Dup.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre, sur *Alnus glutinosa*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Vernayaz.

Strigulatella Z. Is. 1846, 300. *Rayella* Z.

Ch. en septembre et octobre sur *Alnus incana*, en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Nigrescentella Logan. Tr. E. S. Lond. 1851, p. 182, *Bremiella* Frey.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Vicia sepium et angustif.*, *Trifolium medium*, *Medicago sativa*, *Orob.*, etc., en dessous des feuilles. Pap. pendant toute la belle saison. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre.

Lautella Z. L. E. I. 194, t. 1, f. 14.

Ch. en septembre et octobre sur les jeunes pousses de chêne, en nombre sur une feuille en dessous. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Fully.

Ulmifoliella Hb. 444.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le bouleau, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sion.

Fraxinella Z. L. E. I, 216, t. 1 f. 21.

Ch. en septembre et octobre sur *Genista germanica* et *tinctoria*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); sur le Simplon.

Cavella Z. L. E. I, 213, t. 1, f. 19. Schreberella Z.

Ch. en septembre et octobre sur le bouleau, en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Ecône près Riddes.

Viminetorum Stt. I. B. 272. Viminetella H.S.

Ch. en septembre et octobre sur *Salix viminalis*, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sierre, Sion.

Salicicolella Sircom. Zool. 1848, 2271. Capræella Nic.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre, sur divers saules, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sierre.

Salictella Z. L. E. I, 207. t. 1, f. 16.

Ch. en septembre et octobre sur divers saules, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre.

Sorbi Frey Mitth. Naturf. Ges. Zurich 1852, 608. Pomonella H.S.

Ch. en septembre et octobre sur *Sorbus aucuparia* et *Prunus Padus*, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Cerasicolella HS. 784-5. v p. 326. *Mahalebella* Mühl.

Ch. en septembre et octobre sur *Prunus avium*, *Cerasus*, *Armeniaca*, *Mahaleb*, en dessous des feuilles. Pap. en juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Sierre.

Spinicolella Z. L. E. I p. 203, not. I. *Prunella* HS.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Prunus domestica* et *spinosa*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Concomitella Bnks. Mont. Mag. 1899 p. 246. *Pomifoliella* Z.

Ch. en septembre et octobre sur le pommier et l'aubépine en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. Pas commun. Région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Blancardella F. S. E. III, p. 327. *Mespillella* Hw., *Cydoniella* Dup.

Ch. en septembre et octobre sur le pommier, l'alisier, etc. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sion.

Oxyacanthæ Frey Tin. 336. *Pomifoliella* Meyr.

Ch. en septembre et octobre, sur l'aubépine, en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sierre, Salquenen (de R.).

Faginella Z. L. E. I, 204. *Triguttella* Stt.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le hêtre, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Région forestière. Mt-Chemin.

Coryli Nicel. Stett. e. Z. 1851, 36. *Corylella* HS.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le noisetier, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Assez rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.).

Carpinicolella Stt. Cat. Suppl. 13.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le bouleau, etc., en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.).

Junoniella Z. L. E. I. 215, *Vacciniella* Stt.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur *Vaccinium Vitis-idaea*, en dessous des feuilles. Pap. pendant toute la belle saison. Région sous-alpine. Haut-Valais (A.).

Quinqueguttella Stt. Cat. Sup. 12. *Repentella* Sorh.

Ch. en septembre et octobre sur *Salix repens*, en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les lieux tourbeux. Haut-Valais (A.); sur le Simplon.

Quercifoliella Z. Is. 1839, 217.

Ch. en septembre et octobre en dessous des feuilles sur le chêne. Pap. en avril et mai. Rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères.

Platani Stgr. Hor. VII. (1870), 277, t. 3. 18.

Ch. en août en dessous des feuilles du platane. Pap. en juin. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Martigny, Sion.

Cerasinella Reutti Fn. 205. *Quinquenotella* Frey.

Ch. en avril et mai, puis en août et septembre sur *Genista sagittalis* au collet des racines et sur l'écorce des tiges. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salvan.

Corylifoliella Hw. Lep. Br. 580. Br. 580. *Betulæ* HS.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'aubépine, le poirier, le pommier, l'argoussier, le sorbier, etc. en-dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Nicellii Stt. Zool. 1851, App. 172. *Tristigella* Nicel.

Ch. en septembre et octobre sur le noisetier, en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sion, Lens.

Frœlichella Z. Is. 1839, 218.

Ch. en septembre et octobre sur *Alnus glutinosa*, en dessous des feuilles des hauts bouts. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

Stettinensis Nicel. Stett. e. Z. 1852, 219. *Stettinella* HS.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Alnus glutinosa*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion; Salquenen (de R.).

Klemannella F. Sp. II, 509. *Kleemannella* Z.

Ch. en septembre et octobre sur *Alnus glutinosa*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Riddes et de Saxon.

Schreberella F. Sp. II, 304. *Ulmella* Z.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'orme, en dessous des feuilles, plutôt sur les arbrisseaux que sur les arbres élevés. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Fully; Mt-Chemin.

Emberizæpenella Bouché Nat. d. Ins. I, 132.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Lonicera*, en dessous des feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Trifasciella Hw. 576. *Heydenii* Z.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et enfin en septembre et octobre sur *Lonicera*, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août et enfin en novembre. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Populifolella Tr. IX, 2, 188.

Ch. en juillet, puis en août et septembre sur les peupliers, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

Tremulæ Z. L. E. I. 251. *Populifoliella* var. Tr.

Ch. en août et septembre sur le tremble, en dessous des feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de La Croix.

Comparella Z. L. E. I. 257, t. 1, 42.

Ch. en août et septembre sur le peuplier blanc, en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); au pied du Mt-d'Autan.

Gen. Tischeria Z. 1839.

Complanella Hb. 428. *Comparella* HS.

Ch. en septembre et octobre sur le chêne et le châtaignier, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); environs de La Croix et de Plan-Cerisier.

Dodonæa Stt. Nat. Hist. III p. 230, 236.

Ch. en septembre et octobre sur le chêne dont elle mine les feuilles. Pap. en juin. Rare. Région du chêne. Haut-Valais (A.); Branson; Salquenen.

Marginæa Hw. Lep. Br. 556. *Emyella* Dup.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur *Rubus fruticosus*, dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Heinemanni Wck. Cat. éd. II, 1871 p. 333. N^{ro} 2913.

Ch. en août et septembre sur *Rubus cæsius*, *fruticosus* et *Agrimonia*, dont elle mine les feuilles. Pap. en juin. Rare. Région chaude inférieure et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre (de R.).

Gaunacella Dup. Sup. IV, p. 319, t. 76 f. 14.

Ch. en mai et juin, puis en septembre et octobre sur *Prunus spinosa*, *domestica* et *Cerasus*. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen, Vétroz.

Angusticolella Dup. Sup. IV, p. 309, t. 76, f. 3.
Aurifrontella Rag.

Ch. en septembre et octobre sur *Rosa canina*. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

XII. LYONETIIDAE.

A. Lyonetiinæ.

Gen. Lyonetia Hb. 1818.

Clerkella L. S. N. X, 542. **Unipunctella** Steph.

Ch. de juin en août, puis en septembre et octobre sur *Pyrus communis* et *Malus*, *Prunus Cerasus*, *domestica*, *Padus*, *Cratægus*, *Sorbus*. Pap. en avril et mai, puis de juillet en septembre. Rare. Plaine et sous-alpes. Près de Zermatt (Frey).

a) **ab. Aereella** Tr. IX, 2. 192. Plus obscur, avec les ailes antérieures d'un bronzé sale. Avec le type.

Prunifolella Hb. 191.

Ch. en juin, puis en août et septembre sur *Betula*, *Prunus Cerasus*, *Padus* et *spinosa*, *Cotoneaster*, en dessous des feuilles. Pap. en avril, puis en juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Près de Zermatt (Fr.); environs de Martigny.

a) **ab. Padifolella** Hb. 316. Ailes antérieures noires, avec une triple tache brun foncé à la base. Avec le type. Assez abondant près de Zermatt (Fr.).

b) **ab. Albella** Ev. F. V. U. 600. Ailes antérieures d'un blanc de neige, avec la bandelette costale largement brune. Avec le type.

B. Phyllocnistinæ.

Gen. Phyllocnistis. Z. 1848.

Suffusella Z. ls. 1847, 894.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur le tremble dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, puis en août et septembre. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); près Sierre.

Gen. Cemiostoma Z. 1848 (Leucoptera (Hb.) Meyr.)

Susinella H.S. V. p. 342.

Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur le peuplier tremble dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); près Chippis.

Spartifoliella Hb. 335.

Ch. de septembre en avril suiv. sur *Spartium scoparium*, dans un fourreau sous l'écorce des tiges. Pap. en juin et juillet. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salvan.

Wailesella Stt. Weekl. Int. 1858, IV, 44.

Ch. en juin, puis en septembre sur *Genista tinctoria*, dans un nid plat, brunâtre. Pap. en avril et mai, puis en août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.); Salvan.

Lotella Stt. Weekl. Int. 1858, p. 117.

Ch. en juillet sur *Lotus corniculatus*. Pap. en août. Rare. Dans les prairies de la plaine et des sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sion.

Scitella Z. Js. 1839. 214. Clerkella Steph.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur le poirier, le pommier, l'aubépine, le sorbier, dans un nid sur les feuilles. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Gen. Bucculatrix Z. 1848.

Cidarella Z. Is. 1839, 216.

Ch. en avril et mai, puis en septembre et octobre sur *Alnus glutinosa*. Pap. en avril et mai, puis en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Vernayaz.

Ulmella Z. L. E. III, 288 (pr. p.).

Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur l'orme et le chêne; elle se chrysalide à terre. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Fully.

Rhamniella HS. V, p. 430.

Ch. en septembre sur *Rhamnus Frangula* et *cathartica*. Pap. en mai. Assez rare. Dans la région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); Fully, Sierre.

Frangulella Gæze Btr. III, 4. 169. Rhamnifoliella Tr.

Ch. d'août en octobre sur *Rhamnus cathartica* et *Frangula*, en dessous des feuilles. Pap. de mai en juillet. Pas commun. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Fully, Sierre.

Valesiaca Frey Mitth. III, 1870, p. 283.

Ch. inconnue. Pap en juillet sur *Artemisia Absinthium*. Rare. Haut-Valais (A.).

Artemisiæ HS. 858. Artemisiella HS. V. p. 340.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur *Artemisia campestris*. Pap. en mai, puis en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salquenen.

a) var *Ratisbonnensis* SH. Weekl. Int. IX, 157.
Plus clair et moins parsemé de brun. Avec le type.
Haut-Valais (A.).

Gnaphalella Tr. IX, 2. 180.

Ch. en avril et mai, puis en juillet sur *Gnaphalium arenarium* dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin, puis de juillet à septembre. Rare. Région des cultures. Haut-Valais (A.); Salquenen, Viège.

Nigricomella Z. Is. 1839, 215.

Ch. en avril et mai, puis en juin et juillet sur *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Potentilla Anserina*, dont elle mine les feuilles en dessous. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Sierre.

XIII. NEPTICULIDÆ.

Gen. *Nepticula* (Heyd. 1843 Z.)

Atricapitella Hw. Lep. Br. 585.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur le chêne. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Branson.

Ruficapitella Hw. Lep. Br. 586.

Ch. comme la précédente. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Assez rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Branson.

Samiatella HS. 835, V. p. 348.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur le chêne et le châtaignier dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Fully.

Viscerella Stt. Zool. 1853, 3958.

Ch. en septembre et octobre sur l'orme dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Fully, Vétroz.

Anomalella Goetz. Btr. III, 4. 168, 290.

Ch. en juillet, puis de septembre à novembre sur *Rosa canina* et autres rosiers dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre.

Pyri Glitz Jhrs. Hannov. XIV (1865), 42.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le poirier sauvage dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en août. Rare. Région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.); Salquenen.

Oxyacanthella Stt. I. B. 298.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'aubépine dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Splendidissimella HS. V. p. 353.

Ch. en juillet, puis de septembre à novembre sur les diverses ronces dont elle mine les feuilles, Pap. en mai, puis en juillet et août. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); au pied du Mt-d'Autan.

Aurella F. S. E. p. 666.

Ch. en avril, puis en juillet et enfin en octobre sur *Rubus fruticosus* dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juin et enfin en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Gratiosella Stt. Cat. 29. Latifasciella HS.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur l'aubépine dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, puis en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Prunetorum Stt. Ann. 1855, 50. *Perpusillella* HS.

Ch. en septembre et octobre sur *Prunus spinosa*, *Cerasus* et *avium*, dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Ravoire.

Marginicolella Stt. Zool. 1853, 3958.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur l'orme dont elle mine le bord des feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Fully, Vétroz.

Centifoliella Z. L. E. III, 315.

Ch. en juillet, puis en octobre sur les rosiers des jardins dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en août. Rare. Plaine et sous alpes. Haut-Valais (A.) ; Sion.

Argentipedella Z. Is. 1839, 215.

Ch. en septembre et octobre sur le bouleau dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; Ecône.

Turicella HS. V. p. 455. *Turicensis* Frey.

Ch. en juillet, puis en octobre sur le hêtre dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin.

Basalella HS. V. p. 354. *Tityrella* Stt. I. B. 304.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur le hêtre dont elle mine les feuilles. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin.

Malella Stt. I. B. 304.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur le pommier dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en août. Rare. Région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.) ; Sion, Sierre.

Salicis Stt. I. B. 302.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur les saules dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Sion.

Intimilella Z. L. E. III, 323.

Ch. en septembre et octobre sur *Salix fragilis* et autres saules dont elle mine les feuilles. Pap. en juin. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Martigny, Fully.

Weaveri Stt. Ann. 1855, 49, t. 1, f. 5

Ch. en avril et mai sur *Vaccinium Vitis-Idæa*, dont elle mine les feuilles. Pap. en mai et juillet. Rare. Région forestière sous-alpine. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin.

Decentella HS. 815, V. p. 358.

Ch. en septembre et octobre dans les fruits d'*Acer pseudoplatanus*. Pap. en juin. Rare. Région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Anniviers.

Turbidella Z. L. E. III, 321. *Argyropeza* HS.

Ch. en octobre et novembre sur les peupliers dont elle mine les feuilles tombées. Pap. en mai et juin. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

Hannoverella Glitz Stett. e. Z. 1872. p. 25.

Ch. en octobre et novembre sur le peuplier pyramidal, dont elle mine les feuilles tombées. Pap. en mai. Rare. Région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Sion, Saxon.

Trimaculella Hw. Lep. Br. 583. *Rufella* Z.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre et octobre sur divers peupliers dont elle mine les feuilles. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.); Vernayaz.

Subbimaculella Hw. Lep. Br. 583. *Cursoriella* Z.

Ch. en octobre et novembre sur le chêne dont elle mine les feuilles près de la nervure centrale. Pap. en mai et juin. Rare. Région du chêne. Haut-Valais (A.); Branson.

Argyropeza Z. Is. 1839, 215. *Apicella* Stt.

Ch. en octobre et novembre sur le tremble dont elle mine les feuilles vers le pédoncule et près de la nervure centrale. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Ecône près Riddes.

XIV. TALÆPORIIDÆ.

Gen. Talæporia Hb. 1818.

Tubulosa Retz. Gen. et Sp. Ins. p. 44 (1783). *Pseudobombycella* Hb. 212 ♂, 382 ♀. *Andereggella* Dup., *Glabrella* O., *Tessellea* Hw.

Ch. en mai dans un fourreau contre les rochers, les arbres, les palissades; elle vit de graminées et autres plantes basses. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1300 m. Haut-Valais (A.) Mt-Chemin.

Gen. Bankesia Tutt. 1899.

Alpestrella Hein. Schm. D. III, 1. 20.

Ch. en mai et juin contre les rochers. Pap. en juillet et août. Pas commun. Plutôt dans la région montagnieuse. Zermatt, La Forclaz.

Gen. Solenobia (Dup.) Z. 1852.

Clathrella F. R. 38, 1 p. 84. *Triquetrella* Tr.

Ch. en avril et mai sur *Genista*. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); Salvan.

Triquetrella F. R. 39, p. 87.

Ch. en mars et avril (dans un sac) contre les rochers, les murs, les palissades. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. Viège (Bent.).

Inconspicuella Stt. Cat. 6.

Ch. de janvier en avril dans les lichens du bouleau, du chêne et du hêtre. Pap. en avril et mai. Rare. Région forestière des arbres à feuilles. En Valais (Reb. Cat.).

XV. TINEIDÆ.

B. Ochsenheimeriinae.

Gen. Ochsenheimeria Hb. 1822.

Vacculella F. R. Stett. e. Z. 1842, 213 **Taurella** Hb.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans les maisons habitées. Martigny, La Croix, etc.

C. Acrolepiinae.

Gen. Acrolepia Curt. 1838.

Assectella Z. Is. 1839, 203. **Betulella** HS.

Ch. en juillet et août en société sur les fleurs de *Allium Cepa*, *Porrum* et *ursinum*, etc. Pap. en automne et reparait en printemps. Haut-Valais (A.).

Pygmæana Hw. Lep. Br. 438. **Autumnitella** Curt.

Ch. de juillet en septembre sur les feuilles de *Solanum Dulcamara*. Pap. en octobre, passe l'hiver pour reparaitre au printemps. Rare. Haut-Valais (A.); Salquenen.

Granitella Tr. IX, 2. 265.

Ch. de mai en juillet dans les feuilles d'*Inula* et de *Bupthalmum*. Pap. en juin et août. Région inférieure. Haut-Valais (A.); près Tourtemagne.

Gen. Roeslerstammia Z. 1839.

Erxlebella F. Mant. II, 256. *Fuscocuprella* Hw.

Ch. de mai en septembre sur le tilleul et le noisetier. Pap. pendant toute la belle saison. Pas commun. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); près Chippis.

G. Tineinæ.

Gen. Narycia Steph. 1836.
(*Xysmatodoma* Z. 1852.).

Monilifera Geof. Fourc. Ent. Par. II p. 325. *Melanella* Hw., *Stelliferella* F.

Ch. en avril et mai dans un fourreau contre les troncs des arbres fruitiers et forestiers, les palissades, etc. dont elle mange les lichens. Pap. de mai en juillet. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Gen. Diplomoda Z. 1852.

Marginepunctella Steph. Ill. IV, 358. *Siderella* Z.

Ch. d'avril en juillet, contre les vieux arbres, les palissades, etc., dans un fourreau couvert de débris; elle se nourrit de mouches et autres petits insectes. Pap. de juin en août. Pas commun. Région sous-alpine jusqu'à 1600 m. Alpes du Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, La Forclaz, Mt-Ravoire (W. et F.); Gruben, en juillet 1904 (de R.).

Gen. Melasina B. 1840.

Lugubris Hb. Bomb. 216-7. *Ciliaris* O. Ill, 350.

Ch. en avril et mai dans un long fourreau couvert de sable sur des plantes basses: *Sedum acre*, *Calluna*,

Cistus, *Helianthemum*, etc. Pap. en juillet et août. Pas commun. Dans les hauts pâturages de la région alpine, entre 1600 et 2400 m. Col de Balme, Loèche-les-bains, Riffelberg au-dessus de Zermatt, Bellalp; Gruben (de R.).

Gen. Scardia Tr. 1830.

Boleti F. Gen. 282. *Mediellus* Curt., *Choragellus* Z.

Ch. en automne et au printemps dans le bois pourri du chêne, hêtre, peuplier, orme, etc. Pap. de mai en août. Pas commun. Région forestière. Viège (Bent.); Sierre.

Gen. Monopis Hb. 1818 (*Blabophanes* Z.).

Ferruginella Hb. 348. *Ustella* Hw.

Ch. en mai dans le bois pourri. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Dans la région inférieure. Viège (Bent.); Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Rusticella Hb. 339. *Vestianella* Steph.

Ch. en automne et au printemps, dans les fourrures et étoffes de laine. Pap. de mai en août. Assez commun, dans les maisons, granges, etc., jusqu'à 1600 m. Martigny, La Croix, Sion, Sierre, Grimentz, Salquenen.

Gen. Trichophaga Rag. 1894.

Tapetzella L. S. N. X, 536. *Tapetiella* Z.

Ch. en automne et au printemps dans les fourrures, les étoffes de laine, les peaux d'animaux, etc. Pap. de mai en août. Trop commun dans les habitations, les granges, etc., Martigny, La Croix, Sion, Sierre, Salquenen.

Gen. Tinea (L. 1758) Z.

Arcella F. Gen. 295. Repandella Hb.

Ch. dans le bois pourri. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région forestière. Salquenen (de R.).

Parasitella Hb. 16.

Ch. dans les bolets. Pap. en juin. Très rare. Dans la région forestière. Salquenen en juin 1905 et Saillon (de R.).

Arcuatella Stt. I. B. 29. Picarella Hb.

Ch. en automne et au printemps sur *Sisymbrium Sophia* (de R.), *Prunus domestica* et autres arbres. Pap. pendant toute la belle saison. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

Granella L. S. H. X, 537.

Ch. dans les étoffes et les habits, etc. Pap. au printemps et en été. Commun partout. Région chaude. Salquenen (de R.).

Cloacella Hw. Lep. Br. 563. Granella Dup.

Ch. en automne et au printemps dans le bois pourri du chêne, du hêtre, du bouleau et des saules. Pap. de mai en août. Assez commun. Dans la région des arbres à feuilles. La Croix, Fully, Martigny et les environs (W. et F.); Salquenen (de R.).

Albicomella HS. V. p. 74. Albicapilla Z.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais. (A.).

Confusella HS. 276, V. p. 74.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

Misella Z. Is. 1839, 184. ? Fuscicentella Stt.

Ch. en automne et au printemps dans les grains de blé, maïs, etc., les bois pourris, fourrures, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Commun. La Croix, Mt-Ravoire, Mt-Chemin (W. et F.); Salquenen (de R.).

Fuscipunctella Hw. Lep. Cr. 562. *Spretella* Z.

Ch. en automne et au printemps dans les fruits secs, pois, nids d'oiseaux, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Plaine et alpes jusqu'à 2200 m. Haut-Valais (A.); Martigny, Mt-Chemin (W. et F.); Salquenen (de R.).

Pellionella L. S. N. X, 536. *Flavescentella* Hw.

Ch. en automne et au printemps dans les fourrures, étoffes de laine, plumes, nids d'oiseaux, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 2000 m. Haut-Valais (A.); Martigny, Mt-Chemin, etc.

Lapella Hb. 252. *Ganomella* Tr.

Ch. au printemps dans les nids d'oiseaux et dans le bois pourri. Pap. de mai en août. Pas rare. Haut-Valais (A.); Salquenen, Sierre.

Semifulvella Hw. Lep. Br. 562.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare et surtout dans la région chaude. Salquenen ou Inden, un seul exemplaire. (de R.).

Simplicella HS. V. p. 73. *Angusticostella* Z.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Sur les hautes herbes sèches dans les forêts de pins. Mt-Chemin.

Rosenbergerella Nolk. Fn. II, p. 484.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les taillis de la région des arbres à feuilles. Environs de Martigny.

Gen. *Oinophila* Steph. 1848.

V. flavum Hw. Lep. Br. 530. *V. flavella* HS.

Ch. d'avril en juin, dans les bouchons, les champignons, dans la moisissure des fûts de vin et des bouteilles. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre, etc.

Gen. Tineola HS. 1853.

Biselliella Hum. Ess. Ent. III, 13. p. 6-13. Destructor Steph., Crinella Tr.

Ch. pendant toute l'année dans les fourrures, le papier, la laine, les plumes, les collections, etc. Pap. d'avril en automne. Très commun partout, de la plaine aux alpes. Martigny, Fully, Sion, Sierre, Zermatt, Simplon.

Gen. Myrmecozela Z. 1852.

Ochraceella Tgstr. Bidr. 111.

Ch. dans les nids de fourmis, surtout chez *Formica rufa* et *congerens* en automne. Pap. en juillet. Rare. Haut-Valais (A.); Sierre, Sion, Salquenen.

Gen. Incurvaria Hw. 1829.

Flavimitrella Hb. 429.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région chaude ou moyenne. En Valais (de R).

Prælatella Schiff. S. V. p. 320. Luzella Frr.

Ch. en automne et au printemps sur *Fragaria vesca*, *Geum urbanum*, *Spiræa Ulmaria*, dans un sac en dessous des feuilles. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.); Martigny, La Croix, Mt-Chemin, Salquenen.

Rubiella Bjerk, Vet. Ac. Hand. 1781 p. 20. Variella Tr.

Ch. en avril et mai sur *Rubus idæus*, d'abord dans les pousses et plus tard dans les tiges. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans les lieux découverts des bois jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.); Mt-Chemin, Bérisal.

Pubicornis Hw. Lep. Br. 523. *Flavifrontella* Hein.

Ch. en automne et au printemps dans les jeunes pousses de *Rosa spinosissima*, etc. Pap. en mai. Rare. Haut-Valais (A.); sur le Simplon, La Forclaz, hôtel de la Pierre-à-voir.

Vetulella Zett. Ins. Lap. 1007. *Pallidulella* HS.

Ch. en mai sur *Vaccinium Myrtillus* et *Betula*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région montagneuse jusqu'à 1800 m. La Forclaz, Gruben.

Capitella Cl. Ic. 11, 1. *Flavimitrella* Dup.

Ch. en avril et mai, d'abord dans les boutons et en suite dans les tiges de *Ribes rubrum*. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (A.); Grimsel (Rthb.); Mt-Chemin, La Forclaz, Grimentz (de R.).

Oehlmanniella Tr. IX, 2. 122. *Oehlmanni* Hw.

Ch. en automne et au printemps sur *Alsine media*, *Vaccinium Myrtillus*, d'abord dans les feuilles, plus tard vivant dans un sac. Pap. en mai et juin. Rare. Région sous-alpine. Haut-Valais (A.); Bérisal; Gruben (de R.).

Rupella Schiff. S. V. 320. *Capitella* Tr.

Ch. en avril et mai sur *Cacalia montana*, etc. Pap. en juin et juillet. Pas rare et s'élève assez haut dans la région alpine, le plus souvent dans les gorges chaudes et humides à grande végétation. Gemmi, Mt-Chemin, Mt-Ravoire, Arpille, La Forclaz; Grimentz (de R.).

Muscalella F. Mant. II, 249, 91. *Spuria* Hw.

Ch. en automne et au printemps sur l'aubépine, le hêtre et le chêne, d'abord sur les feuilles, ensuite elle passe l'hiver dans un sac lié aux herbes. Pap. en mai et juin. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); environs de Martigny; Salquenen en avril et mai (de R.).

Gen. Nemophora Hb. 1818.

Swammerdammella L. S. N. X, 540.

Ch. en automne et au printemps sur le hêtre et le chêne, d'abord minant les feuilles, ensuite à terre dans un fourreau parmi l'herbe et sous les feuilles. Pap. en avril et mai. Assez commun. Forêts et taillis de la plaine et des sous-alpes jusqu'à 1200 m. Martigny, Fully, La Croix, Plan-Cerisier, Mt-Ravoire ; Salquenen (de R.).

Panzerella Hb. 412 ♂ ; HS. 216 ♀ , V. p. 77.

Ch. en automne et au printemps sur *Vaccinium Myrtillus* et *Prunus spinosa*. Pap. de mai en juillet. Plus rare que le précédent. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.) ; Mt-Chemin, près de Bérisal ; Salquenen (de R.).

Schwarziella Z. Is. 1839, 185. Sericinella Stt.

Ch. en automne et au printemps sous l'écorce du chêne. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région forestière, s'élève jusqu'à 2000 m. environ. Sur le Simplon (Bent.) ; Branson ; forêts de la vallée de Tourtemagne (de R.).

Pilulella Hb. 409. Pilella Tr.

Ch. en avril et mai sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. de mai en juillet. Pas très rare. Dans les forêts de mélèzes de la région des pâturages jusqu'à 2000 m. près. Haut-Valais (A.) ; Bérisal.

Pilella F. Mant. II, 256, 24.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Comme le précédent. En Valais (F. R.) ; Salquenen (de R.).

Metaxella Hb. 413.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans le Bas-Valais, probablement à Saillon (de R.).

H. Adelinæ.

Gen. Nemotois Hb. 1818.

Metallicus Poda Ins. Mus. Gr. p. 94 (1761). *Scabiosellus* Sc.

Ch. en automne et au printemps dans les fleurs de scabieuses, plus tard dans un sac sur le sol. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.); La Croix, Plan-Cerisier.

Violellus Z. L. E. VIII, 61. *Cypriacellus* Z.

Ch. en automne et au printemps sur les fleurs et les fruits de diverses gentianes : *G. lutea*, *asclepiadea* etc. plus tard sur le sol dans un sac. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans les prairies sous-alpines. Haut-Valais (A.); près du village de Simplon.

Minimellus Z. L. E. VIII, 76.

Ch. en automne et au printemps dans les fleurs de *Scabiosa Succisa*, etc. Pap. de juin en août. Rare. Dans les lieux secs sur les fleurs de *Scabiosa Columbaria*. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.). *Obs.* M. de Rougemont observe que son papillon de Salquenen a la tête blanche. Est-ce bien le *Minimellus* ?

Dumeriliellus Dup. XI, 300, 12. *Inauratella* Dup.

Ch. au printemps sur *Hypericum perforatum* et *Hieracium pilosissimum*. Pap. de juin en août. Assez rare. Région inférieure. La Croix, Plan-Cerisier.

Gen. Adela Latr. 1792.

Cuprella Thb. Diss. Ent. VII, 98.

Ch. en automne et au printemps sur les feuilles tombées des saules. Pap. en avril et mai. Très rare. Haut-Valais (A.); Branson, Salquenen.

Viridella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 250. Spingiella Hb.

Ch. au printemps dans un sac sous les feuilles tombées du chêne, du hêtre, de l'érable, etc. Pap. d'avril en juin. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Croesella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 648. Sulzella Schiff.

Ch. en automne et au printemps sur *Ligustrum vulgare*. Pap. en mai et juin. Pas rare. Région inférieure. Sion, Sierre, Viège, Martigny, Salquenen, tout un essaim voltigeant autour d'un buisson de Troène (de R.).

Degeerella L. S. N. X, 540. Geerella Hb.

Ch. en automne et au printemps sur les plantes basses: *Anemone nemorosa*, *Vaccinium*, *Rumex*, *Solidago*, etc. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); sur le Simplon, Salquenen (de R.).

Ochsenheimerella Hb. 359.

Ch. au printemps probablement sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. en juin et juillet. Assez fréquent dans les forêts de mélèzes du Haut-Valais en juillet entre 1800 et 2000 m.; il tombe dans le parasol quand on bat les mélèzes. Haut-Valais (A.); Bérisal (F.); vallée de Tourtemagne (de R.).

Violella Tr. IX, 2. 139. Tombacinella H.S.

Ch. en automne et au printemps dans les capsules d'*Hypericum quadrangulum* et *perforatum*, plus tard dans un sac à la surface du sol. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

Rufimitrella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 649. Frischella Hb.

Ch. en automne et au printemps sur *Sisymbrium Alliaria* et *Cardamine pratensis*. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.); val d'Anniviers.

XVII. ERIOCRANIIDÆ (Micropterygidæ auct.)

Gen. Eriocrania Z. 1851. (Micropteryx auct.)

Sparmannella Bosc. var. **Solierella** Dup. XI. 407.
pl. 302, 11.

Ch. en août et sept. minant les feuilles du bouleau.
Pap. en avril et mai. Rarissime. Dans la région forestière.
Le long du chemin qui conduit de Salquenen à la Varen-
alp. (de R.). Signalé d'abord dans le Midi de la France ;
nouveau pour la Suisse.

Subpurpurella Hw. Lep. Br. 571. Forme à ailes antér.
plus verdâtres, moins parsemées de pourpre.

Ch. en avril sur le chêne. Pap. en mai et juin. Assez
rare. Dans la région du chêne. Follatères, au-dessus de
Plan-Cerisier.

a) var. **Fastuosella** Z. Is. 1839, 185. Plus obscur,
avec les ailes antér. densément parsemées de pourpre
ou de violet. Avec le type. Il butine volontiers sur les
fleurs du prunellier. Haut-Valais (A.).

XVIII. MICROPTERYGIDÆ (Eriocephalidæ).

Gen. Micropteryx Hb. 1818 (Eriocephala Curt.).

Thunbergella F. Mant. II, 253. **Rubrifasciella** Hw.
Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Haut-Valais (A.).

Aureatella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 662. **Allionella** F.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin sur les Myrtilles.
Rare. Visperterminen (Bent.); Mt-Chemin.

Ammanella Hb. 288! **Anderschella**. H S.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin, sur les orties.
les mercuriales et les myrtilles. Rare. Haut-Valais (A.);
Salquenen (de R.).

Aruncella Sc. Ent. Carn. N^{ro} 660.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet sur les fleurs de *Spiræa*, *Actæa* et *Helianthemum*. Rare. Haut-Valais (A.).

Isobasella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Sur le versant méridional des Alpes.

Calthella L. F. S. N^{ro} 1432.

Ch. en avril et mai sur *Caltha palustris*, *Ranunculus repens* et *acris*. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); environs de Martigny, Bérisal.
